

# PROVA SCRITTA A

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI

PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 10 POSTI

DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CATEGORIA D

	<b>Quesito</b>	<b>Riportare risposta corretta</b>
1	<p>La valutazione neurologica con la Glasgow Coma Scale prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. La valutazione di apertura occhi, la risposta verbale, la risposta motoria</li> <li>B. La valutazione di apertura occhi, la risposta verbale e la valutazione dell'udito</li> <li>C. La valutazione della chiusura degli occhi, la risposta verbale e la risposta sensitiva</li> <li>D. La valutazione dell'apertura della bocca, la risposta motoria e la risposta sensitiva</li> </ul>	
2	<p>Un assistito con la presenza di <i>Staphylococcus aureus</i> meticillino-resistente nell'espettorato, tramite quale via di trasmissione può essere fonte di contagio?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Ematica</li> <li>B. Oro-fecale</li> <li>C. Aerea</li> <li>D. Droplet e contatto</li> </ul>	
3	<p>Quale fra le seguenti è la via di nutrizione artificiale più fisiologica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Nutrizione parenterale</li> <li>B. Nutrizione enterale</li> <li>C. Nessuna delle due</li> <li>D. Indifferentemente A e B</li> </ul>	
4	<p>Durante il trasferimento letto-carrozzina di una persona assistita che presenta emiplegia all'emilato destro, la carrozzina deve essere posizionata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Dal lato plegico della persona assistita</li> <li>B. Dal lato sano della persona assistita</li> <li>C. Perpendicolare al lato destro del letto</li> <li>D. Parallela al lato plegico della persona assistita</li> </ul>	
5	<p>L'anisocoria è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. La differente ampiezza del diametro delle pupille</li> <li>B. La perdita della capacità di parlare</li> <li>C. L'incapacità di scrivere</li> <li>D. La mancata coordinazione nell'esecuzione dei movimenti</li> </ul>	
6	<p>E' possibile somministrare una sacca di emocomponenti gruppo 0 Rh negativo ad un paziente di gruppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Gruppo A Rh positivo</li> <li>B. Gruppo A Rh negativo</li> <li>C. Gruppo B Rh negativo</li> <li>D. Tutte le precedenti</li> </ul>	

	<b>Quesito</b>	<b>Riportare risposta corretta</b>
7	<p>Aspirando in una siringa 6 millilitri di una soluzione di lidocaina al 2%, quanti milligrammi di lidocaina saranno presenti nel liquido aspirato?</p> <p>A. 120 milligrammi B. 1200 milligrammi C. 0,12 milligrammi D. 12 milligrammi</p>	
8	<p>Secondo il comma 3 dell'articolo 1 del Decreto 14 settembre 1994, n. 739 "Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere", è previsto che l'infermiere:</p> <p>A. Garantisca la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche B. Garantisca la corretta esecuzione degli ordini del medico C. Garantisca esclusivamente la corretta applicazione delle prescrizioni farmacologiche D. Nessuna delle precedenti</p>	
9	<p>La persona assistita rientra in degenza dalla Sala Operatoria con un'infusione di morfina. Quale delle seguenti valutazioni potrebbe indicare un effetto avverso alla terapia con oppioidi?</p> <p>A. Punteggio dolore 3/10 scala NRS (Numeric Rating Scale) B. Creatininemia alta C. Oliguria D. Bradipnea</p>	
10	<p>La rilevazione del dolore di un assistito adulto da parte dell'infermiere deve essere svolta:</p> <p>A. Esclusivamente all'ingresso in degenza ed in fase di dimissione B. Almeno due volte al giorno e dopo ogni intervento di terapia antalgica, registrando il dato in cartella clinica C. Solo se l'assistito segnala spontaneamente la presenza di dolore D. Dopo 60 minuti dalla somministrazione parenterale di un farmaco e dopo 30 minuti dalla somministrazione enterale di un farmaco</p>	
11	<p>Quando si effettua il prelievo di sangue tramite catetere venoso periferico quale dispositivo di protezione individuale si deve indossare:</p> <p>A. Guanti sterili B. Guanti puliti C. Camice sterile D. Nessun dispositivo</p>	

	<b>Quesito</b>	<b>Riportare risposta corretta</b>
12	<p>Nella corretta gestione del CVC (Catetere Venoso Centrale) la sostituzione delle linee infusionali deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Con tecnica asettica</li> <li>B. Non più frequentemente di 96 ore per le infusioni continue</li> <li>C. Ogni 24 ore per le nutrizioni parenterali totali</li> <li>D. Tutte le risposte sono corrette</li> </ul>	
13	<p>Per la corretta gestione di un catetere vescicale è indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Disconnettere il circuito durante il trasporto del paziente</li> <li>B. Eseguire lavaggi vescicali a circuito aperto</li> <li>C. Utilizzare tecniche asettiche durante l’inserimento</li> <li>D. Chiudere il catetere per la ginnastica vescicale</li> </ul>	
14	<p>La somministrazione della Nutrizione Enterale attraverso la PEG (Gastrostomia Endoscopica Percutanea) può iniziare solo dopo 24 ore dal confezionamento. La miscela nutritiva può essere somministrata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Attraverso un bolo unico (circa 200-400C) attraverso una siringa con tecnica “gavage”</li> <li>B. In infusione intermittente, durante la giornata la miscela viene suddivisa in porzioni uguali e viene somministrata in 3-6 volte</li> <li>C. In maniera continua, 24 ore su 24, con pompa infusione</li> <li>D. Tutte le risposte precedenti</li> </ul>	
15	<p>Quale dei seguenti passaggi appartiene all’articolo 5 della Legge 8 marzo 2017, n°24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, anche conosciuta come Legge Gelli Bianco?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie [...], si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida [...]</li> <li>B. [...] in mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico assistenziali</li> <li>C. Tutte le risposte precedenti appartengono all’articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n°24 Gelli-Bianco</li> <li>D. Nessuna delle risposte precedenti appartengono all’articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n°24 Gelli-Bianco</li> </ul>	


	<b>Quesito</b>	<b>Riportare risposta corretta</b>
16	<p>Secondo l'articolo 7 del Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati (Regolamento (UE) 2016/679) tra le condizioni per il consenso figurano:</p> <p>A. se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. [...]</p> <p>B. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di prestare il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.</p> <p>C. Le risposte A e B sono entrambe corrette</p> <p>D. Nessuna delle precedenti</p>	
17	<p>L'art. 3 del Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche 2019 relativamente al "RISPETTO E ALLA NON DISCRIMINAZIONE" precisa quanto segue?</p> <p>A. L'Infermiere cura e si prende cura della persona assistita, nel rispetto della dignità, della libertà, dell'eguaglianza, delle sue scelte di vita e concezione di salute e benessere, senza alcuna distinzione sociale, di genere, di orientamento della sessualità, etnica, religiosa e culturale</p> <p>B. L'Infermiere si astiene da ogni forma di discriminazione e colpevolizzazione nei confronti di tutti coloro che incontra nel suo operare</p> <p>C. L'Infermiere si affida al metodo del buon padre di famiglia</p> <p>D. Le affermazioni al punto A e B sono entrambe corrette</p>	
18	<p>Alla dimissione dell'assistito dall'Unità Operativa (UO) di degenza, la documentazione clinico-assistenziale:</p> <p>A. Deve essere conservata nell'UO di riferimento per almeno un anno e successivamente archiviata</p> <p>B. Deve essere consegnata all'assistito, o al suo caregiver, in quanto riconosciuto come possessore legittimo dei dati sensibili in essa contenuti</p> <p>C. Deve essere conservata illimitatamente in appositi archivi autonomi dell'azienda</p> <p>D. Non deve essere conservata</p>	

	<b>Quesito</b>	<b>Riportare risposta corretta</b>
19	<p>Fra i principi basilari della norma n. 219 del 22 dicembre 2017 “Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento”, vi è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. La tutela contro gli atti di violenza</li> <li>B. La tutela del diritto alla autodeterminazione</li> <li>C. La tutela del diritto alla privacy</li> <li>D. La tutela dei beni personali della persona in Ospedale</li> </ul>	
20	<p>Quando va eseguita l’antisepsi cutanea e la tricotomia preoperatoria?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Eseguire l’antisepsi cutanea almeno la sera prima dell’intervento e la tricotomia immediatamente prima dell’intervento</li> <li>B. Eseguire l’antisepsi cutanea e la tricotomia al domicilio almeno 24 ore prima dell’ingresso in ospedale</li> <li>C. Non è raccomandato procedere all’antisepsi cutanea pre chirurgica</li> <li>D. Nessuna delle precedenti</li> </ul>	
21	<p><b>Indicare 6 principali aspetti-funzioni da monitorare nel paziente chirurgico nelle prime 4-6 ore dopo l’intervento chirurgico</b></p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	

22	<p><b>Indicare 6 principali manifestazioni cliniche presenti nel paziente con trauma cranico</b></p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
23	<p><b>Indicare 4 vantaggi che offre lo strofinamento alcolico rispetto al lavaggio mani</b></p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

24	<p><b>Tradurre in italiano o descrivere il significato della seguente frase</b></p> <p>What does a lack of sleep do to us? As well as making us irritable and unhappy as people it also reduces our motivation and ability to work. This has serious implications for society in general. Doctors and nurses, for example, are often chronically sleep deprived especially when they are on “night call” and may get less than three hours’ sleep.</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
25	<p><b>Quali sono i principali programmi di posta elettronica?</b></p> <p><b>E’ possibile impostare qualche opzione specifica per l’invio del messaggio?</b></p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>





# PROVA SCRITTA B

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI

PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 10 POSTI

DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CATEGORIA D

	<b>Quesito</b>	<b>Riportare risposta corretta</b>
1	<p>La maschera Venturi, escludendo l'uso per tracheostomia, permette l'erogazione valori variabili di FiO<sub>2</sub> ovvero:</p> <p>A. Dal 24% al 60%</p> <p>B. Dal 15% al 30%</p> <p>C. Dal 70 % al 100%</p> <p>D. Dal 95% al 99%</p>	
2	<p>Per isolamento si intende:</p> <p>A. La separazione di un paziente dall'ambiente esterno e l'abolizione di qualsiasi contatto</p> <p>B. L'adozione di precauzioni aggiuntive per l'isolamento dei germi</p> <p>C. Una misura di profilassi delle malattie infettive</p> <p>D. Tutte le precedenti</p>	
3	<p>In presenza di celiachia, qual è il principale nutriente da eliminare dalla propria alimentazione?</p> <p>A. Fosforo</p> <p>B. Glutine</p> <p>C. Sodio</p> <p>D. Lattosio</p>	
4	<p>Durante il trasferimento letto-carrozzina di una persona assistita che presenta emiplegia all'emilato destro, la carrozzina deve essere posizionata:</p> <p>A. Dal lato plegico della persona assistita</p> <p>B. Dal lato sano della persona assistita</p> <p>C. Perpendicolare al lato destro del letto</p> <p>D. Parallela al lato plegico della persona assistita</p>	
5	<p>Per miosi nel paziente adulto si intende:</p> <p>A. La diminuzione del diametro della pupilla</p> <p>B. Un'alterazione del miocardio su base infiammatoria</p> <p>C. La differente ampiezza del diametro delle pupille</p> <p>D. Una condizione in cui il diametro della pupilla supera i 5 millimetri</p>	
6	<p>E' possibile somministrare una sacca di emocomponenti gruppo 0 Rh positivo ad un paziente di gruppo:</p> <p>A. Gruppo 0 Rh negativo</p> <p>B. Gruppo A Rh positivo</p> <p>C. Gruppo A Rh negativo</p> <p>D. Gruppo B Rh negativo</p>	
7	<p>Quanti milligrammi di principio attivo si trovano in un millilitro di soluzione all'1%?</p> <p>A. 0,1 milligrammi</p> <p>B. 10 milligrammi</p> <p>C. 1 milligrammo</p> <p>D. 100 milligrammi</p>	

	<b>Quesito</b>	<b>Riportare risposta corretta</b>
8	<p>Secondo la Legge 26 febbraio 1999, n. 42 <i>“Disposizioni in materia di professioni sanitarie”</i>, il profilo professionale determina il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie insieme agli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post base</li> <li>B. Specifici codici deontologici</li> <li>C. Le risposte A e B sono entrambe corrette</li> <li>D. Nessuna delle precedenti</li> </ul>	
9	<p>Quale dei seguenti farmaci è un antagonista dell’insulina?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Glucagone</li> <li>B. Pralidossima</li> <li>C. Solfato di Protamina</li> <li>D. Naloxone</li> </ul>	
10	<p>La rilevazione del dolore di un assistito adulto da parte dell’infermiere deve essere svolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Esclusivamente all’ingresso in degenza ed in fase di dimissione</li> <li>B. Almeno due volte al giorno e dopo ogni intervento di terapia antalgica, registrando il dato in cartella clinica</li> <li>C. Solo se l’assistito segnala spontaneamente la presenza di dolore</li> <li>D. Dopo 60 minuti dalla somministrazione parenterale di un farmaco e dopo 30 minuti dalla somministrazione enterale di un farmaco</li> </ul>	
11	<p>Quando si effettua il prelievo di sangue tramite catetere venoso periferico quale dispositivo di protezione individuale si deve indossare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Guanti sterili</li> <li>B. Guanti puliti</li> <li>C. Camice sterile</li> <li>D. Nessun dispositivo</li> </ul>	
12	<p>Nella corretta gestione del CVC (Catetere Venoso Centrale) la sostituzione delle linee infusionali deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Con tecnica asettica</li> <li>B. Non più frequentemente di 96 ore per le infusioni continue</li> <li>C. Ogni 24 ore per le nutrizioni parenterali totali</li> <li>D. Tutte le risposte sono corrette</li> </ul>	
13	<p>Per la corretta gestione di un catetere vescicale è indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Disconnettere il circuito durante il trasporto del paziente</li> <li>B. Eseguire lavaggi vescicali a circuito aperto</li> <li>C. Utilizzare tecniche asettiche durante l’inserimento</li> <li>D. Chiudere il catetere per la ginnastica vescicale</li> </ul>	

	<b>Quesito</b>	<b>Riportare risposta corretta</b>
14	<p>La somministrazione della Nutrizione Enterale attraverso la PEG (Gastrostomia Endoscopica Percutanea) può iniziare solo dopo 24 ore dal confezionamento. La miscela nutritiva può essere somministrata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Attraverso un bolo unico (circa 200-400C) attraverso una siringa con tecnica “gavage”</li> <li>B. In infusione intermittente, durante la giornata la miscela viene suddivisa in porzioni uguali e viene somministrata in 3-6 volte</li> <li>C. In maniera continua, 24 ore su 24, con pompa infusione</li> <li>D. Tutte le risposte precedenti</li> </ul>	
15	<p>Quale dei seguenti passaggi appartiene all’articolo 5 della Legge 8 marzo 2017, n°24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, anche conosciuta come Legge Gelli Bianco?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie [...], si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida [...]</li> <li>B. [...] in mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico assistenziali</li> <li>C. Tutte le risposte precedenti appartengono all’articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n°24 Gelli-Bianco</li> <li>D. Nessuna delle risposte precedenti appartengono all’articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n°24 Gelli-Bianco</li> </ul>	
16	<p>Secondo l’articolo 7 del Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati (Regolamento (UE) 2016/679) tra le condizioni per il consenso figurano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. [...]</li> <li>B. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di prestare il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.</li> <li>C. Le risposte A e B sono entrambe corrette</li> <li>D. Nessuna delle precedenti</li> </ul>	

	<b>Quesito</b>	<b>Riportare risposta corretta</b>
17	<p>L'art. 3 del Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche 2019 relativamente al "RISPETTO E ALLA NON DISCRIMINAZIONE" precisa quanto segue?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. L'Infermiere cura e si prende cura della persona assistita, nel rispetto della dignità, della libertà, dell'eguaglianza, delle sue scelte di vita e concezione di salute e benessere, senza alcuna distinzione sociale, di genere, di orientamento della sessualità, etnica, religiosa e culturale</li> <li>B. L'Infermiere si astiene da ogni forma di discriminazione e colpevolizzazione nei confronti di tutti coloro che incontra nel suo operare</li> <li>C. L'Infermiere si affida al metodo del buon padre di famiglia</li> <li>D. Le affermazioni al punto A e B sono entrambe corrette</li> </ul>	
18	<p>Alla dimissione dell'assistito dall'Unità Operativa (UO) di degenza, la documentazione clinico-assistenziale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Deve essere conservata nell'UO di riferimento per almeno un anno e successivamente archiviata</li> <li>B. Deve essere consegnata all'assistito, o al suo caregiver, in quanto riconosciuto come possessore legittimo dei dati sensibili in essa contenuti</li> <li>C. Deve essere conservata illimitatamente in appositi archivi autonomi all'interno dell'azienda</li> <li>D. Non deve essere conservata</li> </ul>	
19	<p>Fra i principi basilari della norma n. 219 del 22 dicembre 2017 "Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento", vi è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. La tutela contro gli atti di violenza</li> <li>B. La tutela del diritto alla autodeterminazione</li> <li>C. La tutela del diritto alla privacy</li> <li>D. La tutela dei beni personali della persona in Ospedale</li> </ul>	
20	<p>Quando va eseguita l'antisepsi cutanea e la tricotomia preoperatoria?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Eseguire l'antisepsi cutanea almeno la sera prima dell'intervento e la tricotomia immediatamente prima dell'intervento</li> <li>B. Eseguire l'antisepsi cutanea e la tricotomia al domicilio almeno 24 ore prima dell'ingresso in ospedale</li> <li>C. Non è raccomandato procedere all'antisepsi cutanea pre chirurgica</li> <li>D. Nessuna delle precedenti</li> </ul>	

21	<p><b>Indicare 6 interventi che devono essere messi in atto al fine di prevenire l'insorgenza di una Trombosi Venosa Profonda.</b></p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
22	<p><b>Indicare 6 principali manifestazioni cliniche del paziente con ictus.</b></p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
23	<p><b>Indicare 4 vantaggi che offre lo strofinamento alcolico rispetto al lavaggio mani</b></p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

24	<p><b>Tradurre in italiano o descrivere il significato delle seguenti frasi</b></p> <p>Sleep tips:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Give sleep a high priority in your life</li><li>b. Listen to your body. If you feel tired, you probably need more sleep</li><li>c. Have a regular routine, try to go to bed at roughly the same time every day.</li><li>d. Make sure your bedroom isn't too hot</li><li>e. Don't use your bedroom as an office or for watching TV</li></ul> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
25	<p><b>Qual è il significato dell'acronimo PEC? Che peculiarità ha?</b></p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>



# PROVA SCRITTA C

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI

PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 10 POSTI

DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CATEGORIA D

	<b>Quesito</b>	<b>Riportare risposta corretta</b>
1	<p>La maschera facciale per ossigenoterapia Venturi permette:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. L'erogazione di flusso di ossigeno predeterminato</li> <li>B. Di ottenere un FiO<sub>2</sub> (frazione inspiratoria di ossigeno) desiderata grazie all'utilizzo di appositi raccordi</li> <li>C. Di raggiungere un FiO<sub>2</sub> (frazione inspiratoria di ossigeno) fino al 60%</li> <li>D. Tutte le precedenti</li> </ul>	
2	<p>Un infermiere sta spiegando le modalità di trasmissione dell'epatite A ad un collega in addestramento. Qual è la sequenza corretta della catena dell'infezione?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Soggetto infetto-feci-vettore-apparato gastroenterico</li> <li>B. Soggetto infetto-vettore-circolo ematico-cute lesa</li> <li>C. Soggetto infetto-apparato gastroenterico-trasmissione da contatto-feci</li> <li>D. Trasmissione da contatto -apparato gastroenterico-soggetto infetto</li> </ul>	
3	<p>In presenza di insufficienza renale, i principali nutrienti da monitorare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Gli zuccheri semplici</li> <li>B. I carboidrati complessi</li> <li>C. Le proteine</li> <li>D. I grassi saturi</li> </ul>	
4	<p>Durante il trasferimento letto-carrozzina di una persona assistita che presenta emiplegia all'emilato destro, la carrozzina deve essere posizionata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Dal lato plegico della persona assistita</li> <li>B. Dal lato sano della persona assistita</li> <li>C. Perpendicolare al lato destro del letto</li> <li>D. Parallela al lato plegico della persona assistita</li> </ul>	
5	<p>Per midriasi nel paziente adulto si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Una condizione in cui il diametro della pupilla supera i 5 millimetri</li> <li>B. La diminuzione del diametro della pupilla</li> <li>C. La differente ampiezza del diametro delle pupille</li> <li>D. Diminuzione della risposta motoria della pupilla alla luce</li> </ul>	
6	<p>Un paziente di gruppo AB Rh positivo può essere trasfuso con emocomponenti di gruppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Gruppo A Rh positivo</li> <li>B. Gruppo A Rh negativo</li> <li>C. Gruppo B Rh negativo</li> <li>D. Tutte le precedenti</li> </ul>	
7	<p>Quanti milligrammi di principio attivo si trovano in 10 millilitri di una soluzione al 2%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. 20 milligrammi</li> <li>B. 2 milligrammi</li> <li>C. 200 milligrammi</li> <li>D. 0,2 milligrammi</li> </ul>	

	<b>Quesito</b>	<b>Riportare risposta corretta</b>
8	<p>Secondo il comma 4 dell'articolo 1 del Decreto 14 settembre 1994, n. 739 "Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere", l'infermiere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Concorre all'aggiornamento del proprio profilo professionale</li> <li>B. Concorre all'aggiornamento relativo alla ricerca</li> <li>C. Contribuisce alla formazione del personale di supporto</li> <li>D. Tutte le precedenti</li> </ul>	
9	<p>Secondo la Raccomandazione del Ministero della Salute Raccomandazione n.1 dell'Aprile 2005 "RACCOMANDAZIONE SUL CORRETTO UTILIZZO DELLE SOLUZIONI CONCENTRATE DI CLORURO DI POTASSIO – KCL – ED ALTRE SOLUZIONI CONCENTRATE CONTENENTI POTASSIO" come devono essere conservate le soluzioni concentrate di potassio?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Conservate sui carrelli di terapia pronti all'uso</li> <li>B. In compartimenti/armadi riservati, separati dagli altri medicinali, possibilmente chiusi a chiave e segnalati dalla scritta di allerta "Diluire prima della somministrazione: mortale se infuso non diluito"</li> <li>C. Conservate negli armadi con gli altri principi attivi della stessa forma farmaceutica</li> <li>D. Conservate esclusivamente presso il Pronto Soccorso con gli altri principi attivi della stessa forma farmaceutica</li> </ul>	
10	<p>La rilevazione del dolore di un assistito adulto da parte dell'infermiere deve essere svolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Esclusivamente all'ingresso in degenza ed in fase di dimissione</li> <li>B. Almeno due volte al giorno e dopo ogni intervento di terapia analgica, registrando il dato in cartella clinica</li> <li>C. Solo se l'assistito segnala spontaneamente la presenza di dolore</li> <li>D. Dopo 60 minuti dalla somministrazione parenterale di un farmaco e dopo 30 minuti dalla somministrazione enterale di un farmaco</li> </ul>	
11	<p>Quando si effettua il prelievo di sangue tramite catetere venoso periferico quale dispositivo di protezione individuale si deve indossare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Guanti sterili</li> <li>B. Guanti puliti</li> <li>C. Camice sterile</li> <li>D. Nessun dispositivo</li> </ul>	
12	<p>Nella corretta gestione del CVC (Catetere Venoso Centrale) la sostituzione delle linee infusionali deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Con tecnica asettica</li> <li>B. Non più frequentemente di 96 ore per le infusioni continue</li> <li>C. Ogni 24 ore per le nutrizioni parenterali totali</li> <li>D. Tutte le risposte sono corrette</li> </ul>	

	<b>Quesito</b>	<b>Riportare risposta corretta</b>
13	<p>Per la corretta gestione di un catetere vescicale è indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Disconnettere il circuito durante il trasporto del paziente</li> <li>B. Eseguire lavaggi vescicali a circuito aperto</li> <li>C. Utilizzare tecniche asettiche durante l’inserimento</li> <li>D. Chiudere il catetere per la ginnastica vescicale</li> </ul>	
14	<p>La somministrazione della Nutrizione Enterale attraverso la PEG (Gastrostomia Endoscopica Percutanea) può iniziare solo dopo 24 ore dal confezionamento. La miscela nutritiva può essere somministrata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Attraverso un bolo unico (circa 200-400C) attraverso una siringa con tecnica “gavage”</li> <li>B. In infusione intermittente, durante la giornata la miscela viene suddivisa in porzioni uguali e viene somministrata in 3-6 volte</li> <li>C. In maniera continua, 24 ore su 24, con pompa infusione</li> <li>D. Tutte le risposte precedenti</li> </ul>	
15	<p>Quale dei seguenti passaggi appartiene all’articolo 5 della Legge 8 marzo 2017, n°24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, anche conosciuta come Legge Gelli Bianco?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie [...], si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida [...]</li> <li>B. [...] in mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico assistenziali</li> <li>C. Tutte le risposte precedenti appartengono all’articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n°24 Gelli-Bianco</li> <li>D. Nessuna delle risposte precedenti appartengono all’articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n°24 Gelli-Bianco</li> </ul>	
16	<p>Secondo l’articolo 7 del Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati (Regolamento (UE) 2016/679) tra le condizioni per il consenso figurano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. [...]</li> <li>B. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di prestare il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.</li> <li>C. Le risposte A e B sono entrambe corrette</li> <li>D. Nessuna delle precedenti</li> </ul>	

	<b>Quesito</b>	<b>Riportare risposta corretta</b>
17	<p>L'art. 3 del Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche 2019 relativamente al "RISPETTO E ALLA NON DISCRIMINAZIONE" precisa quanto segue?</p> <p>A. L'Infermiere cura e si prende cura della persona assistita, nel rispetto della dignità, della libertà, dell'eguaglianza, delle sue scelte di vita e concezione di salute e benessere, senza alcuna distinzione sociale, di genere, di orientamento della sessualità, etnica, religiosa e culturale</p> <p>B. L'Infermiere si astiene da ogni forma di discriminazione e colpevolizzazione nei confronti di tutti coloro che incontra nel suo operare</p> <p>C. L'Infermiere si affida al metodo del buon padre di famiglia</p> <p>D. Le affermazioni al punto A e B sono entrambe corrette</p>	
18	<p>Alla dimissione dell'assistito dall'Unità Operativa (UO) di degenza, la documentazione clinico-assistenziale:</p> <p>A. Deve essere conservata nell'UO di riferimento per almeno un anno e successivamente archiviata</p> <p>B. Deve essere consegnata all'assistito, o al suo caregiver, in quanto riconosciuto come possessore legittimo dei dati sensibili in essa contenuti</p> <p>C. Deve essere conservata illimitatamente in appositi archivi autonomi all'interno dell'azienda</p> <p>D. Non deve essere conservata</p>	
19	<p>Fra i principi basilari della norma n. 219 del 22 dicembre 2017 "Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento", vi è:</p> <p>A. La tutela contro gli atti di violenza</p> <p>B. La tutela del diritto alla autodeterminazione</p> <p>C. La tutela del diritto alla privacy</p> <p>D. La tutela dei beni personali della persona in Ospedale</p>	
20	<p>Quando va eseguita l'antisepsi cutanea e la tricotomia preoperatoria?</p> <p>A. Eseguire l'antisepsi cutanea almeno la sera prima dell'intervento e la tricotomia immediatamente prima dell'intervento</p> <p>B. Eseguire l'antisepsi cutanea e la tricotomia al domicilio almeno 24 ore prima dell'ingresso in ospedale</p> <p>C. Non è raccomandato procedere all'antisepsi cutanea pre chirurgica</p> <p>D. Nessuna delle precedenti</p>	

21	<p><b>Indicare 3 interventi assistenziali da garantire al paziente durante la fase di acme febbrile e indicare 3 interventi assistenziali da garantire al paziente durante la fase e di defervescenza della febbre.</b></p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
22	<p><b>Indicare 6 principali manifestazioni cliniche del paziente con embolia polmonare</b></p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
23	<p><b>Indicare 4 vantaggi che offre lo strofinamento alcolico rispetto al lavaggio mani</b></p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>

24	<p><b>Tradurre o restituire il significato della seguente frase</b></p> <p>Albert Beal wants a change of his career. He desires to become a midwife. For this reason he needs to attend the University and training for three years at least.</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
25	<p><b>Per quale motivo è di prassi salvare un documento in formato PDF?</b></p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>

# PROVA SCRITTA D

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI

PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 10 POSTI

DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CATEGORIA D



	<b>Quesito</b>	<b>Riportare risposta corretta</b>
1	<p>Il catetere di Swan Ganz permette:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. La misurazione della pressione venosa</li> <li>B. La misurazione della pressione in arteria polmonare</li> <li>C. L'infusione di liquidi e farmaci</li> <li>D. Tutte le precedenti</li> </ul>	
2	<p>Un infermiere deve posizionare un catetere vescicale con tecnica sterile. Quale accorgimento deve adottare per non contaminare il campo sterile?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Aprire il telo sterile tenendolo lontano dal corpo</li> <li>B. Durante il collocamento sul campo sterile tenere il materiale distante circa 30 centimetri dal piano di lavoro</li> <li>C. Valutare l'integrità, l'indicatore di sterilità e la presenza di eventuale umidità delle confezioni sterili</li> <li>D. Tutte le precedenti</li> </ul>	
3	<p>In presenza di accertata disfagia ai soli liquidi è indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Assumere liquidi solo per via endovenosa</li> <li>B. Assumere per via orale liquidi addensati o acqua gelificata</li> <li>C. Assumere tanta frutta come sola fonte di idratazione</li> <li>D. Sospendere qualsiasi tipo di alimentazione per via orale</li> </ul>	
4	<p>Individui quali tra i presidi in elenco non sono riconosciuti come mezzi per la contenzione fisica della persona assistita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Bendaggio chirurgico compressivo</li> <li>B. Spondine e ferma-caviglie</li> <li>C. Ferma-polsi e cintura pelvica</li> <li>D. Cintura addominale e ferma-polsi</li> </ul>	
5	<p>Cos'è una pandemia?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. La comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un certo territorio in un breve periodo di tempo</li> <li>B. Una malattia che, diffondendosi rapidamente tra le persone, si espande in vaste aree geografiche su scala planetaria</li> <li>C. La presenza costante di un numero limitato di casi di una malattia in un certo territorio</li> <li>D. Nessuna delle precedenti</li> </ul>	
6	<p>E' possibile somministrare una sacca di emocomponenti gruppo AB Rh negativo ad un paziente di gruppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Gruppo 0 Rh positivo</li> <li>B. Gruppo A Rh positivo</li> <li>C. Gruppo AB Rh positivo</li> <li>D. Gruppo B Rh negativo</li> </ul>	

	<b>Quesito</b>	<b>Riportare risposta corretta</b>
7	<p>Se si vuole somministrare 50 milligrammi di una soluzione all'1%, quanti millilitri della stessa soluzione è necessario utilizzare?</p> <p>A. 10 millilitri B. 0,5 millilitri C. 5 millilitri D. 50 millilitri</p>	
8	<p>Secondo il comma 4 dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 739 "Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere", l'infermiere:</p> <p>A. Contribuisce alla formazione del personale di supporto B. Ha competenza esclusiva in materia di formazione del personale di supporto C. Non contribuisce alla formazione del personale di supporto in quanto competenza esclusiva del personale di supporto medesimo D. Nessuna delle precedenti</p>	
9	<p>Individui gli interventi di educazione sanitaria da prevedere nel piano di dimissione ad un paziente in terapia con anticoagulante orale:</p> <p>A. Istruire la persona assistita circa le modalità e i tempi di assunzione del farmaco B. Istruire la persona assistita circa i potenziali rischi legati all'assunzione del farmaco C. Istruire la persona assistita circa le possibili interazioni con altri farmaci e alimenti D. Tutte le risposte sono corrette</p>	
10	<p>Identifichi quale tra i seguenti outcomes descritti in letteratura corrisponde ad un insieme di esiti correlati all'assistenza (Nursing Sensitive Outcomes – NSO):</p> <p>A. Infezioni del tratto urinario, errori di somministrazione dei farmaci B. Lesioni da pressione, uso delle contenzioni, dolore, cadute C. Infezione della ferita chirurgica, soddisfazione e benessere lavorativo, soddisfazione dell'utente, self-care D. Tutte le precedenti</p>	
11	<p>Quale delle seguenti scale è una scala di rilevazione del rischio di compromissione dell'integrità cutanea ?</p> <p>A. NRS (Numerical Rating Scale) B. Braden C. Glasgow D. Stratify</p>	

	<b>Quesito</b>	<b>Riportare risposta corretta</b>
12	<p>Nella corretta gestione del CVC (Catetere Venoso Centrale) la medicazione dell'exit-site :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Semipermeabile sterile va cambiata almeno ogni 5-7 giorni</li> <li>B. Con garza e cerotto sterile va cambiata ogni 2 giorni</li> <li>C. Va sostituita subito in caso di secrezioni o dolorabilità della sede</li> <li>D. Tutte le risposte sono corrette</li> </ul>	
13	<p>Quale di queste misure contribuisce a contenere la contaminazione vescicale nella persona portatrice di catetere vescicale?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Disconnettere il circuito durante le fasi di trasporto del paziente</li> <li>B. Sostituire il catetere vescicale ogni quindici giorni</li> <li>C. Mantenere la sacca delle urine al di sotto del livello vescicale</li> <li>D. Mantenere la sacca delle urine al di sopra del livello vescicale</li> </ul>	
14	<p>E' possibile somministrare farmaci attraverso la PEG (Gastrostomia Endoscopica Percutanea) seguendo alcuni accorgimenti, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Somministrare il farmaco senza sospendere la nutrizione per evitare il rischio di precipitazione degli alimenti o dei farmaci</li> <li>B. Somministrare solo formule farmaceutiche liquide</li> <li>C. Somministrare un farmaco alla volta, irrigando la sonda dopo ogni somministrazione.</li> <li>D. Somministrare le compresse dopo averle frantumate finemente e diluite nella miscela nutritiva</li> </ul>	
15	<p>Secondo l'articolo 6 <i>“Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria”</i> della Legge 8 marzo 2017, n. 24 <i>“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida [...]</li> <li>B. Qualora l'evento si sia verificato a causa di negligenza, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida [...]</li> <li>C. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imprudenza, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida [...]</li> <li>D. Nessuna delle precedenti</li> </ul>	

	<b>Quesito</b>	<b>Riportare risposta corretta</b>
16	<p>Secondo l'articolo 4 del Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati (Regolamento (UE) 2016/679) la definizione di "dati relativi alla salute" è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. I dati personali attinenti alla salute esclusivamente fisica di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute</li> <li>B. I dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute</li> <li>C. I dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, esclusa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute</li> <li>D. Nessuna delle precedenti</li> </ul>	
17	<p>Sulla "SUPERVISIONE E SICUREZZA" l'art. 11 del Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche 2019 precisa quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. L'ambito della Sicurezza non è trattato dal Codice Deontologico</li> <li>B. L'Infermiere si forma e chiede supervisione, laddove vi siano attività nuove o sulle quali si abbia limitata casistica e comunque ogni qualvolta ne ravvisi la necessità</li> <li>C. L'Infermiere si forma e chiede supervisione esclusivamente laddove vi siano attività pericolose per gli assistiti o sulle quali si abbia limitata casistica</li> <li>D. L'Infermiere chiede supervisione solo se ne ravvisa la necessità e attraverso il supporto di un medico</li> </ul>	
18	<p>I requisiti cui deve conformarsi la documentazione clinica (sia essa analogica o elettronica) sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Accuratezza, essenzialità, veridicità</li> <li>B. Chiarezza, pertinenza, tempestività</li> <li>C. Completezza e tracciabilità</li> <li>D. Tutte le precedenti</li> </ul>	
19	<p>Secondo la norma n. 219 del 22 dicembre 2017 "Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento", il consenso informato acquisito durante la degenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Deve essere consegnato in originale al paziente</li> <li>B. Deve essere inserito in documentazione clinica di ricovero e nel fascicolo elettronico</li> <li>C. Deve essere consegnato alla famiglia in caso di persona ricoverata non competente</li> <li>D. Deve esser eliminato dopo l'espletamento della procedura/intervento</li> </ul>	

20	<p>Cosa si intende per profilassi antibiotica perioperatoria?</p> <p>A. Si intende la somministrazione di antibiotici 30-60 minuti precedenti l'inizio dell'intervento, in assenza di infezione di fatto, allo scopo di prevenirne l'insorgenza e la successiva diffusione. L'uso dell'antibiotico in questo caso non ha finalità terapeutiche, ma solo preventive</p> <p>B. Si intende la somministrazione di antibiotici il giorno prima dell'intervento. L'uso dell'antibiotico in questo caso ha finalità terapeutiche</p> <p>C. Si intende la somministrazione di antibiotici una settimana prima dell'intervento. L'uso dell'antibiotico in questo caso ha finalità terapeutiche</p> <p>D. Si intende la somministrazione di antibiotici una settimana prima dell'intervento. L'uso dell'antibiotico in questo caso non ha finalità terapeutiche</p>	
21	<p><b>Indicare 6 caratteristiche del dolore che devono essere valutate nel paziente (eventualmente seguendo anche il sistema PQRST)</b></p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	
22	<p><b>Indicare 6 principali manifestazioni cliniche del paziente con ipoglicemia acuta</b></p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	

23	<p><b>Elenchi i cinque momenti indicati dall'OMS in cui è prevista l'applicazione dell'igiene delle mani:</b></p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
24	<p><b>Tradurre o restituire il significato della seguente frase</b></p> <p>The question “ what kind of music do you like?” is very revealing. It is the number one topic of conversation among young adults who are getting to know each other, according to psychologists from the Universities of Cambridge and Texas.</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
25	<p><b>Quali sono i programmi/componenti del pacchetto office?</b></p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>

# PROVA SCRITTA E

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI

PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 10 POSTI

DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CATEGORIA D

	<b>Quesito</b>	<b>Riportare risposta corretta</b>
1	Uno dei ritmi cardiaci in cui è indicata la defibrillazione è: A. L'asistolia B. Il blocco atrio-ventricolare di primo grado (BAV 1°) C. La tachicardia ventricolare senza polso D. Il ritmo sinusale	
2	Affinché lo strofinamento alcoolico sia efficace è necessario: A. Utilizzare una quantità di prodotto tale che, durante lo strofinamento, non si asciughi prima dei 10-20 secondi B. Utilizzare almeno 5 ml di soluzione alcoolica C. Asciugare le mani con carta assorbente dopo aver eseguito lo strofinamento alcoolico D. Precedere lo strofinamento alcoolico da lavaggio con acqua e sapone	
3	Quale tra i seguenti alimenti è da eliminare in un paziente a rischio di disfagia: A. Porea B. Omogeneizzato C. Minestrina con pasta di piccolo formato D. Budino	
4	Individui quali tra i presidi in elenco non sono riconosciuti come mezzi per la contenzione fisica della persona assistita: A. Bendaggio chirurgico compressivo B. Spondine e ferma-caviglie C. Ferma-polsi e cintura pelvica D. Cintura addominale e ferma-polsi	
5	Cos'è un'epidemia? A La comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un certo territorio in un breve periodo di tempo B Una malattia che, diffondendosi rapidamente tra le persone, si espande in vaste aree geografiche su scala planetaria C La presenza costante di un numero limitato di casi di una malattia in un certo territorio D Nessuna delle precedenti	
6	E' possibile somministrare una sacca di emocomponenti gruppo A Rh negativo ad un paziente di gruppo: A. Gruppo 0 Rh positivo B. Gruppo A Rh positivo C. Gruppo 0 Rh negativo D. Gruppo B Rh negativo	



	<b>Quesito</b>	<b>Riportare risposta corretta</b>
7	<p>Quanti milligrammi di principio attivo si trovano in 1 millilitro di Ropivacaina allo 0,2%?</p> <p>A. 0,2 milligrammi B. 20 milligrammi C. 200 milligrammi D. 2 milligrammi</p>	
8	<p>Quale riferimento normativo definisce il “Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere”?</p> <p>A. Decreto del ministero della sanità 14 settembre 1994, N° 739 B. Decreto del ministero dell’istruzione 14 settembre 1996, N° 739 C. Legge 26 febbraio 1999, n. 42 D. Decreto del ministero della sanità 14 settembre 1994, n° 740</p>	
9	<p>Quale colore differenzia l’ogiva dei contenitori mobili, comunemente detti “bombole” di Gas Medicinali, contenente ossigeno?</p> <p>A. Verde B. Grigio C. Blu D. Bianco</p>	
10	<p>Identifichi quale tra i seguenti outcomes descritti in letteratura corrisponde ad un insieme di esiti correlati all’assistenza (Nursing Sensitive Outcomes – NSO):</p> <p>A. Infezioni del tratto urinario, errori di somministrazione dei farmaci B. Lesioni da pressione, uso delle contenzioni, dolore, cadute C. Infezione della ferita chirurgica, soddisfazione e benessere lavorativo, soddisfazione dell’utente, self-care D. Tutte le precedenti</p>	
11	<p>Quale delle seguenti scale è una scala di rilevazione del rischio di compromissione dell’ integrità cutanea ?</p> <p>A. NRS (Numerical Rating Scale) B. Braden C. Glasgow D. Stratify</p>	

	<b>Quesito</b>	<b>Riportare risposta corretta</b>
12	<p>Nella corretta gestione del CVC (Catetere Venoso Centrale) la medicazione dell'exit-site :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Semipermeabile sterile va cambiata almeno ogni 5-7 giorni</li> <li>B. Con garza e cerotto sterile va cambiata ogni 2 giorni</li> <li>C. Va sostituita subito in caso di secrezioni o dolorabilità della sede</li> <li>D. Tutte le risposte sono corrette</li> </ul>	
13	<p>Quale di queste misure contribuisce a contenere la contaminazione vescicale nella persona portatrice di catetere vescicale?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Disconnettere il circuito durante le fasi di trasporto del paziente</li> <li>B. Sostituire il catetere vescicale ogni quindici giorni</li> <li>C. Mantenere la sacca delle urine al di sotto del livello vescicale</li> <li>D. Mantenere la sacca delle urine al di sopra del livello vescicale</li> </ul>	
14	<p>E' possibile somministrare farmaci attraverso la PEG (Gastrostomia Endoscopica Percutanea) seguendo alcuni accorgimenti, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Somministrare il farmaco senza sospendere la nutrizione per evitare il rischio di precipitazione degli alimenti o dei farmaci</li> <li>B. Somministrare solo formule farmaceutiche liquide</li> <li>C. Somministrare un farmaco alla volta, irrigando la sonda dopo ogni somministrazione.</li> <li>D. Somministrare le compresse dopo averle frantumate finemente e diluite nella miscela nutritiva</li> </ul>	
15	<p>Secondo l'articolo 6 <i>“Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria”</i> della Legge 8 marzo 2017, n. 24 <i>“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida [...]</li> <li>B. Qualora l'evento si sia verificato a causa di negligenza, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida [...]</li> <li>C. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imprudenza, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida [...]</li> <li>D. Nessuna delle precedenti</li> </ul>	

	<b>Quesito</b>	<b>Riportare risposta corretta</b>
16	<p>Secondo l'articolo 4 del Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati (Regolamento (UE) 2016/679) la definizione di "dati relativi alla salute" è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. I dati personali attinenti alla salute esclusivamente fisica di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute</li> <li>B. I dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute</li> <li>C. I dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, esclusa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute</li> <li>D. Nessuna delle precedenti</li> </ul>	
17	<p>Sulla "SUPERVISIONE E SICUREZZA" l'art. 11 del Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche 2019 precisa quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. L'ambito della Sicurezza non è trattato dal Codice Deontologico</li> <li>B. L'Infermiere si forma e chiede supervisione, laddove vi siano attività nuove o sulle quali si abbia limitata casistica e comunque ogni qualvolta ne ravvisi la necessità</li> <li>C. L'Infermiere si forma e chiede supervisione esclusivamente laddove vi siano attività pericolose per gli assistiti o sulle quali si abbia limitata casistica</li> <li>D. L'Infermiere chiede supervisione solo se ne ravvisa la necessità e attraverso il supporto di un medico</li> </ul>	
18	<p>I requisiti cui deve conformarsi la documentazione clinica (sia essa analogica o elettronica) sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Accuratezza, essenzialità, veridicità</li> <li>B. Chiarezza, pertinenza, tempestività</li> <li>C. Completezza e tracciabilità</li> <li>D. Tutte le precedenti</li> </ul>	
19	<p>Secondo la norma n. 219 del 22 dicembre 2017 "Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento", il consenso informato acquisito durante la degenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Deve essere consegnato in originale al paziente</li> <li>B. Deve essere inserito in documentazione clinica di ricovero e nel fascicolo elettronico</li> <li>C. Deve essere consegnato alla famiglia in caso di persona ricoverata non competente</li> <li>D. Deve esser eliminato dopo l'espletamento della procedura/intervento</li> </ul>	

	<b>Quesito</b>	<b>Riportare risposta corretta</b>
20	<p>Cosa si intende per profilassi antibiotica perioperatoria?</p> <p>A. Si intende la somministrazione di antibiotici 30-60 minuti precedenti l'inizio dell'intervento, in assenza di infezione di fatto, allo scopo di prevenirne l'insorgenza e la successiva diffusione. L'uso dell'antibiotico in questo caso non ha finalità terapeutiche, ma solo preventive</p> <p>B. Si intende la somministrazione di antibiotici il giorno prima dell'intervento. L'uso dell'antibiotico in questo caso ha finalità terapeutiche</p> <p>C. Si intende la somministrazione di antibiotici una settimana prima dell'intervento. L'uso dell'antibiotico in questo caso ha finalità terapeutiche</p> <p>D. Si intende la somministrazione di antibiotici una settimana prima dell'intervento. L'uso dell'antibiotico in questo caso non ha finalità terapeutiche</p>	
21	<p><b>Indicare 6 principali effetti collaterali che dovremmo considerare in un paziente in terapia con oppioidi per il trattamento del dolore acuto/cronico?</b></p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	
22	<p><b>Indicare 6 principali manifestazioni cliniche del paziente con ipertensione arteriosa</b></p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	

23	<p><b>Elenchi i cinque momenti indicati dall'OMS in cui è prevista l'applicazione dell'igiene delle mani:</b></p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
24	<p><b>Tradurre o restituire il significato della seguente frase</b></p> <p>Things that really annoy us:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dentists who try to chat to you when your mouth is full of equipment</li> <li>b. When you want to buy something in a shop and you have to wait for the shop assistant to finish a telephone conversation with a friend</li> <li>c. When you get a taxi and the driver asks you the best way to go</li> </ul> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
25	<p><b>Che cosa è un browser? Quali browser conosce?</b></p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>

# PROVA SCRITTA F

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI

PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 10 POSTI

DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CATEGORIA D

	<b>Quesito</b>	<b>Riportare risposta corretta</b>
1	<p>Il respiro di Cheyne-Stokes può essere presente nei traumi del sistema nervoso centrale ed è caratterizzato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Respiro irregolare, gradualmente più veloce e profondo, poi lento e superficiale, per arrivare a periodi di apnea fino anche a 60 secondi</li> <li>B. Respiro irregolare, superficiale</li> <li>C. Respiro irregolare, lento, profondo, a bocca aperta</li> <li>D. Respiro regolare superficiale molto rapido</li> </ul>	
2	<p>Un infermiere sta effettuando un esame colturale su una ferita. Quale sequenza di azioni è la più appropriata?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Rimuovere la medicazione sporca, disinfettare la ferita, inserire il tampone nel terreno di coltura e applicare una medicazione pulita</li> <li>B. Rimuovere la medicazione sporca, inserire il tampone colturale nella ferita, inserire il tampone nel terreno di coltura, confezionare il campione per il trasporto, detergere, disinfettare la ferita e applicare una medicazione pulita</li> <li>C. Rimuovere la medicazione sporca, inserire il tampone colturale nella ferita, inserire il tampone nel terreno di coltura, confezionare il campione per il trasporto, disinfettare la ferita e applicare una medicazione pulita</li> <li>D. Nessuna delle precedenti</li> </ul>	
3	<p>Come si calcola il BMI (Body mass index o IMC Indice di Massa Corporea):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. <math>\text{Peso} \div \text{Altezza}</math></li> <li>B. <math>\text{Peso} + \text{Altezza}</math></li> <li>C. <math>\text{Peso} - \text{Altezza}</math></li> <li>D. <math>\text{Peso} \div \text{Altezza al quadrato}</math></li> </ul>	
4	<p>Individui quali tra i presidi in elenco non sono riconosciuti come mezzi per la contenzione fisica della persona assistita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Bendaggio chirurgico compressivo</li> <li>B. Spondine e ferma-caviglie</li> <li>C. Ferma-polsi e cintura pelvica</li> <li>D. Cintura addominale e ferma-polsi</li> </ul>	
5	<p>Cos'è un'endemia?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. La comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un certo territorio in un breve periodo di tempo</li> <li>B. Una malattia che, diffondendosi rapidamente tra le persone, si espande in vaste aree geografiche su scala planetaria</li> <li>C. Costante permanenza, in un determinato territorio, di una malattia che tende a presentarsi sporadicamente o a piccoli focolai e con una incidenza relativamente uniforme,</li> <li>D. Nessuna delle precedenti</li> </ul>	

	<b>Quesito</b>	<b>Riportare risposta corretta</b>
6	<p>E' possibile somministrare una sacca di emocomponenti gruppo B Rh negativo ad un paziente di gruppo:</p> <p>A. Gruppo 0 Rh positivo  B. Gruppo A Rh positivo  C. Gruppo 0 Rh negativo  D. Gruppo B Rh positivo</p>	
7	<p>Dovendo somministrare 400 milligrammi di antibiotico in soluzione orale ad una concentrazione di 250 milligrammi in 25 millilitri, quanti millilitri di soluzione deve assumere il paziente?</p> <p>A. 0,4 millilitri  B. 4 millilitri  C. 12 millilitri  D. 40 millilitri</p>	
8	<p>Quali sono le aree di formazione infermieristica post base inerenti alla pratica specialistica identificate all'art. 1 comma 5 del Decreto Ministeriale del 14 settembre 1994 n° 739 "Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere"?</p> <p>A. Management per le professioni sanitarie ed area critica  B. Management per le professioni sanitarie, area critica ed area pediatrica  C. Sanità pubblica, pediatria, salute mentale-psichiatria, geriatria, area critica  D. Area territoriale, infermieristica di comunità</p>	
9	<p>Quale farmaco viene utilizzato per neutralizzare l'azione dell'eparina in caso di sovradosaggio?</p> <p>A. Glucagone  B. Pralidossima  C. Solfato di Protamina  D. Naloxone</p>	
10	<p>Identifichi quale tra i seguenti outcomes descritti in letteratura corrisponde ad un insieme di esiti correlati all'assistenza (Nursing Sensitive Outcomes – NSO):</p> <p>A. Infezioni del tratto urinario, errori di somministrazione dei farmaci  B. Lesioni da pressione, uso delle contenzioni, dolore, cadute  C. Infezione della ferita chirurgica, soddisfazione e benessere lavorativo, soddisfazione dell'utente, self-care  D. Tutte le precedenti</p>	
11	<p>Quale delle seguenti scale è una scala di rilevazione del rischio di compromissione dell' integrità cutanea ?</p> <p>A. NRS (Numerical Rating Scale)  B. Braden  C. Glasgow  D. Stratify</p>	



	<b>Quesito</b>	<b>Riportare risposta corretta</b>
12	<p>Nella corretta gestione del CVC (Catetere Venoso Centrale) la medicazione dell'exit-site :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Semipermeabile sterile va cambiata almeno ogni 5-7 giorni</li> <li>B. Con garza e cerotto sterile va cambiata ogni 2 giorni</li> <li>C. Va sostituita subito in caso di secrezioni o dolorabilità della sede</li> <li>D. Tutte le risposte sono corrette</li> </ul>	
13	<p>Quale di queste misure contribuisce a contenere la contaminazione vescicale nella persona portatrice di catetere vescicale?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Disconnettere il circuito durante le fasi di trasporto del paziente</li> <li>B. Sostituire il catetere vescicale ogni quindici giorni</li> <li>C. Mantenere la sacca delle urine al di sotto del livello vescicale</li> <li>D. Mantenere la sacca delle urine al di sopra del livello vescicale</li> </ul>	
14	<p>E' possibile somministrare farmaci attraverso la PEG (Gastrostomia Endoscopica Percutanea) seguendo alcuni accorgimenti, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Somministrare il farmaco senza sospendere la nutrizione per evitare il rischio di precipitazione degli alimenti o dei farmaci</li> <li>B. Somministrare solo formule farmaceutiche liquide</li> <li>C. Somministrare un farmaco alla volta, irrigando la sonda dopo ogni somministrazione.</li> <li>D. Somministrare le compresse dopo averle frantumate finemente e diluite nella miscela nutritiva</li> </ul>	
15	<p>Secondo l'articolo 6 <i>“Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria”</i> della Legge 8 marzo 2017, n. 24 <i>“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida [...]</li> <li>B. Qualora l'evento si sia verificato a causa di negligenza, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida [...]</li> <li>C. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imprudenza, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida [...]</li> <li>D. Nessuna delle precedenti</li> </ul>	

	<b>Quesito</b>	<b>Riportare risposta corretta</b>
16	<p>Secondo l'articolo 4 del Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati (Regolamento (UE) 2016/679) la definizione di "dati relativi alla salute" è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. I dati personali attinenti alla salute esclusivamente fisica di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute</li> <li>B. I dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute</li> <li>C. I dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, esclusa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute</li> <li>D. Nessuna delle precedenti</li> </ul>	
17	<p>Sulla "SUPERVISIONE E SICUREZZA" l'art. 11 del Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche 2019 precisa quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. L'ambito della Sicurezza non è trattato dal Codice Deontologico</li> <li>B. L'Infermiere si forma e chiede supervisione, laddove vi siano attività nuove o sulle quali si abbia limitata casistica e comunque ogni qualvolta ne ravvisi la necessità</li> <li>C. L'Infermiere si forma e chiede supervisione esclusivamente laddove vi siano attività pericolose per gli assistiti o sulle quali si abbia limitata casistica</li> <li>D. L'Infermiere chiede supervisione solo se ne ravvisa la necessità e attraverso il supporto di un medico</li> </ul>	
18	<p>I requisiti cui deve conformarsi la documentazione clinica (sia essa analogica o elettronica) sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Accuratezza, essenzialità, veridicità</li> <li>B. Chiarezza, pertinenza, tempestività</li> <li>C. Completezza e tracciabilità</li> <li>D. Tutte le precedenti</li> </ul>	
19	<p>Secondo la norma n. 219 del 22 dicembre 2017 "Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento", il consenso informato acquisito durante la degenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Deve essere consegnato in originale al paziente</li> <li>B. Deve essere inserito in documentazione clinica di ricovero e nel fascicolo elettronico</li> <li>C. Deve essere consegnato alla famiglia in caso di persona ricoverata non competente</li> <li>D. Deve esser eliminato dopo l'espletamento della procedura/intervento</li> </ul>	

20	<p>Cosa si intende per profilassi antibiotica perioperatoria?</p> <p>A. Si intende la somministrazione di antibiotici 30-60 minuti precedenti l'inizio dell'intervento, in assenza di infezione di fatto, allo scopo di prevenirne l'insorgenza e la successiva diffusione. L'uso dell'antibiotico in questo caso non ha finalità terapeutiche, ma solo preventive</p> <p>B. Si intende la somministrazione di antibiotici il giorno prima dell'intervento. L'uso dell'antibiotico in questo caso ha finalità terapeutiche</p> <p>C. Si intende la somministrazione di antibiotici una settimana prima dell'intervento. L'uso dell'antibiotico in questo caso ha finalità terapeutiche</p> <p>D. Si intende la somministrazione di antibiotici una settimana prima dell'intervento. L'uso dell'antibiotico in questo caso non ha finalità terapeutiche</p>	
21	<p><b>Indicare 4 complicanze da considerare in un paziente in nutrizione enterale</b></p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	
22	<p><b>Indicare 6 principali manifestazioni cliniche del paziente con cirrosi epatica</b></p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	

23	<p><b>Elenchi i cinque momenti indicati dall'OMS in cui è prevista l'applicazione dell'igiene delle mani:</b></p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
24	<p><b>Tradurre o restituire il significato della seguente frase</b></p> <p>Luke is every nutritionist's nightmare: a fifteen -year-old who never eats anything except bread and jam, unbelievably, he is perfectly healthy. He never been seriously ill apart from typical childhood illness</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
25	<p><b>Cosa è una rete internet? Cosa è una rete intranet?</b></p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>

# PROVA SCRITTA G

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI

PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 10 POSTI

DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CATEGORIA D

	<b>Quesito</b>	<b>Riportare risposta corretta</b>
1	<p>La sonda nasogastrica di Sengstaken-Blakemore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Ha due palloncini di gonfiaggio indipendenti</li> <li>B. E' efficace nel sanguinamento delle varici esofagee</li> <li>C. Viene introdotta attraverso una narice</li> <li>D. Tutte le precedenti</li> </ul>	
2	<p>Nell'esecuzione di una emocoltura quale tra queste azioni non è corretta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Eseguire la raccolta sempre prima dell'inizio della terapia antibiotica</li> <li>B. Eseguire sempre almeno due campioni da prelievi diversi</li> <li>C. Se il paziente è portatore di devices vascolari centrali, siano essi impiantati oppure no, eseguire esclusivamente prelievi da device</li> <li>D. Per ogni prelievo utilizzare un flacone per anaerobi e successivamente uno per aerobi in questa sequenza</li> </ul>	
3	<p>In presenza di diabete di tipo 2, è raccomandato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Prediligere prodotti integrali</li> <li>B. Eliminare i carboidrati complessi (pasta, pane, patate)</li> <li>C. Eliminare la frutta</li> <li>D. Ridurre l'apporto di grassi e proteine</li> </ul>	
4	<p>Quali sono gli "ausili" facilitanti la movimentazione delle persone assistite?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Carrozzine</li> <li>B. Materassi anti decubito, ciambelle, sollevatore</li> <li>C. Lenzuolo, cintura ergonomica, barella</li> <li>D. Sollevatori, teli ad alto scorrimento, cintura ergonomica.</li> </ul>	
5	<p>Definisci la pollachiuria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Difficoltà alla minzione</li> <li>B. Insufficienza funzionale dello sfintere uretrale</li> <li>C. Dolore che segue o accompagna la minzione</li> <li>D. Aumento della frequenza della minzione</li> </ul>	
6	<p>La chiusura della valvola tricuspide durante la sistole impedisce il reflusso di sangue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Dal ventricolo destro nell'atrio destro</li> <li>B. Dal sinistro destro nell'atrio sinistro</li> <li>C. Atrio sinistro nell'aorta</li> <li>D. Atrio destro nell'arteria polmonare</li> </ul>	
7	<p>Un paziente deve assumere per via orale 8 milligrammi di un farmaco in sospensione orale, disponibile in dosaggio di 20 milligrammi in 10 millilitri. Quanti millilitri devono essere somministrati?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. 4 millilitri</li> <li>B. 8 millilitri</li> <li>C. 10 millilitri</li> <li>D. 6 millilitri</li> </ul>	

	<b>Quesito</b>	<b>Riportare risposta corretta</b>
8	<p>Il profilo professionale dell'infermiere, istituito con il Decreto Ministeriale del 14 settembre 1994 n° 739, identifica come attività proprie della professione infermieristica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. L'assistenza generale infermieristica, per la quale al professionista viene riconosciuta piena responsabilità</li> <li>B. L'identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e la formulazione dei relativi obiettivi</li> <li>C. La pianificazione, gestione e valutazione dell'intervento assistenziale infermieristico</li> <li>D. Tutte le precedenti</li> </ul>	
9	<p>Il paziente sottoposto a chemioterapia antitumorale può manifestare i seguenti effetti collaterali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Disturbi del sonno</li> <li>B. Dolori ossei</li> <li>C. Mucosite</li> <li>D. Ipertensione</li> </ul>	
10	<p>La contenzione fisica, quale atto di restrizione intenzionale dei movimenti o del comportamento volontario di una persona mediante mezzi fisici, è una procedura che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Deve essere considerata come atto eccezionale, finalizzato al bene della persona ed effettuato nel rispetto della dignità della persona</li> <li>B. Non necessita di prescrizione medica in quanto è sufficiente il giudizio clinico-assistenziale dell'infermiere per procedere all'attivazione</li> <li>C. Deve essere sempre messa in atto per garantire la protezione degli assistiti in stato di agitazione psico-motoria in quanto non esistono strategie che ne consentano la prevenzione</li> <li>D. Tutte le precedenti</li> </ul>	
11	<p>La rimozione e sostituzione del catetere venoso periferico deve essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Ogni 24 ore</li> <li>B. Su richiesta della persona assistita</li> <li>C. In presenza di medicazione sporca</li> <li>D. In presenza di flogosi locale</li> </ul>	
12	<p>I criteri che indicano una buona funzionalità della pervietà del CVC (Catetere Venoso Centrale) sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. E' possibile iniettare facilmente</li> <li>B. E' possibile aspirare sangue facilmente</li> <li>C. La persona assistita non segnala alterazioni o sensazioni dolorose durante il lavaggio/infusione</li> <li>D. Tutte le risposte sono corrette</li> </ul>	

	<b>Quesito</b>	<b>Riportare risposta corretta</b>
13	<p>Quale tra le seguenti indicazioni per la ginnastica vescicale è appropriata in paziente portatore di catetere vescicale?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. La ginnastica vescicale non è raccomandata</li> <li>B. La ginnastica vescicale è raccomandata e va effettuata prima della rimozione del catetere ad intervalli superiori a due ore</li> <li>C. La ginnastica vescicale non è raccomandata se viene effettuata ad intervalli inferiori a due ore</li> <li>D. La ginnastica vescicale va sempre effettuata in quanto riduce il rischio che la persona assistita possa presentare ritenzione urinaria dopo la rimozione del catetere</li> </ul>	
14	<p>Quale tra le seguenti affermazioni, in merito alla gestione della PEG (Gastrostomia Endoscopica Percutanea), si ritiene sia corretta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Detergere e disinfettare la cute peristomale quotidianamente per la prima settimana dal posizionamento; in seguito sarà sufficiente detergere la zona peristomale con acqua e sapone neutro e mantenere asciutta la zona peristomale per evitare macerazione.</li> <li>B. Medicare “a piatto” con medicazione impermeabile per la prima settimana dal posizionamento</li> <li>C. Mobilizzare la sonda con movimenti di rotazione e di intensa trazione, per prevenire eventuali sue incarcerazioni</li> <li>D. Tenere coperta la PEG con garze sterili per le prime 72 ore dopo la sua applicazione, nei giorni a seguire non è necessario disinfettare la cute e controllare eventuali alterazioni della zona peristomale</li> </ul>	
15	<p>Secondo la Legge 8 marzo 2017, n. 24 <i>“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”</i>, gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. raccomandazioni previste dalle linee guida [...] elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie [...]</li> <li>B. alle buone pratiche clinico-assistenziali in mancanza delle raccomandazioni previste dalle linee guida [...]</li> <li>C. Le risposte A e B sono entrambe corrette</li> <li>D. Nessuna delle precedenti</li> </ul>	



	<b>Quesito</b>	<b>Riportare risposta corretta</b>
16	<p>Individui gli interventi di educazione sanitaria da prevedere nel piano di dimissione ad un paziente in terapia immunosoppressiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Istruire la persona assistita circa le modalità e i tempi di assunzione del farmaco</li> <li>B. Istruire la persona assistita circa i potenziali rischi legati all'assunzione del farmaco</li> <li>C. Istruire la persona assistita circa le possibili interazioni con altri farmaci e alimenti</li> <li>D. Tutte le risposte sono corrette</li> </ul>	
17	<p>L'Infermiere è tenuto a rispettare la volontà della persona assistita di non voler essere informata sul proprio stato di salute (art. 20 del Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche 2019)?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Sì, se l'informazione rifiutata è però necessaria per la salute di soggetti terzi, l'Infermiere si adopera a responsabilizzare l'assistito fornendo le informazioni relative al rischio e alla condotta potenzialmente lesiva</li> <li>B. Sì poiché l'informazione è di competenza medica</li> <li>C. No se ciò costituisce una decisione poco autodeterminata</li> <li>D. Sì sempre</li> </ul>	
18	<p>Tra i requisiti essenziali per la costruzione delle Linee Guida si riconoscono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. La valutazione rigorosa delle fonti attraverso una revisione sistematica della letteratura</li> <li>B. La multidisciplinarietà del gruppo di lavoro con il coinvolgimento di membri rappresentanti gli assistiti o i caregiver; nonché la programmazione di consultazioni regolari con gli stakeholders</li> <li>C. La chiara esplicitazione dei livelli delle evidenze e della forza delle raccomandazioni</li> <li>D. Tutte le precedenti</li> </ul>	
19	<p>Nella norma n. 219 del 22 dicembre 2017 "Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento", si specifica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere revocate in qualsiasi momento</li> <li>B. Le disposizioni anticipate di trattamento sono obbligatorie</li> <li>C. Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere registrate esclusivamente in presenza delle forze dell'Ordine</li> <li>D. Le disposizioni anticipate di trattamento perdono di valore se la persona è incosciente</li> </ul>	

20	<p>Che cosa è lo stomacare?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Si definisce stomacare l'igiene, l'apparecchiatura della stomia e l'educazione dell'assistito alla gestione della stomia</li> <li>B. Si definisce stomacare la valutazione prechirurgica dell'area in cui apparecchiare la stomia</li> <li>C. Si definisce stomacare il lavaggio del moncone stomale</li> <li>D. Si definisce stomacare la protezione gastrica in caso di terapia con farmaci antiinfiammatori</li> </ul>	
21	<p><b>Indicare 6 i fattori di rischio che possono condurre alla caduta accidentale in ambito assistenziale</b></p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	
22	<p><b>Indicare 6 principali manifestazioni cliniche del paziente con edema polmonare</b></p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	

23	<p><b>Il lavaggio delle mani può essere sociale, antisettico e chirurgico. Cosa differenzia i vari tipi di lavaggio</b></p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
24	<p><b>Tradurre o restituire il significato della seguente frase</b></p> <p>I arrived on time! I picked up my suitcase and followed the exit signs. It was great not to have to wait ages for my luggage or to worry about getting a bus to the city center.</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
25	<p><b>Cosa si intende per LOGIN?</b></p> <p>-----</p> <p>-----</p>

# PROVA SCRITTA H

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI

PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 10 POSTI

DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CATEGORIA D

	<b>Quesito</b>	<b>Riportare risposta corretta</b>
1	<p>Le crisi generalizzate tonico-cloniche durano in genere:</p> <p>A. 10 minuti B. 1-2 minuti C. 30 minuti D. 60 minuti</p>	
2	<p>Quale tra le seguenti costituisce la principale infezione opportunistica in corso di AIDS?</p> <p>A. Polmonite da Pneumocystis Carinii B. Meningite Batterica C. Endocardite D. Pielonefrite</p>	
3	<p>I nutrienti energetici sono:</p> <p>A. Proteine, carboidrati, grassi B. Proteine, carboidrati, sali minerali C. Proteine, carboidrati, grassi, vitamine D. Proteine, carboidrati, grassi, sali minerali</p>	
4	<p>Quali sono gli "ausili" facilitanti la movimentazione delle persone assistite?</p> <p>A. Carrozzine B. Materassi anti decubito, ciambelle, sollevatore C. Lenzuolo, cintura ergonomica, barella D. Sollevatori, teli ad alto scorrimento, cintura ergonomica</p>	
5	<p>Cosa significa disfagia?</p> <p>A. Deglutizione difficoltosa B. Articolazione difficile della parola C. Impossibilità assoluta al passaggio del cibo nell'esofago D. Dolore crampiforme retrosternale</p>	
6	<p>La chiusura della valvola mitrale o bicuspidale durante la sistole impedisce il reflusso di sangue:</p> <p>A. Dal ventricolo destro nell'atrio destro B. Dal ventricolo sinistro nell'atrio sinistro C. Atrio sinistro nell'aorta D. Atrio destro nell'arteria polmonare</p>	
7	<p>Ad un paziente sono prescritti 4 milligrammi endovena di un farmaco disponibile in soluzione allo 0,2%. Quanti millilitri di farmaco saranno da somministrare?</p> <p>A. 4 millilitri B. 5,5 millilitri C. 2 millilitri D. 20 millilitri</p>	

	<b>Quesito</b>	<b>Riportare risposta corretta</b>
8	<p>Il profilo professionale dell'infermiere, istituito con il Decreto Ministeriale del 14 settembre 1994 n° 739, all'art. 1 comma 1 definisce l'infermiere come:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. L'operatore sanitario ausiliario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale infermieristica</li> <li>B. L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, si occupa dell'erogazione dell'assistenza infermieristica anche in assenza dell'iscrizione all'albo professional</li> <li>C. L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale collabora all'erogazione dell'assistenza</li> <li>D. L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica</li> </ul>	
9	<p>Come deve essere somministrato un farmaco chemioterapico antiblastico?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Contestualmente da 2 operatori</li> <li>B. Indossando DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) idonei</li> <li>C. Esclusivamente a digiuno</li> <li>D. Solo per via parenterale</li> </ul>	
10	<p>La contenzione fisica, quale atto di restrizione intenzionale dei movimenti o del comportamento volontario di una persona mediante mezzi fisici, è una procedura che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Deve essere considerata come atto eccezionale, finalizzato al bene della persona ed effettuato nel rispetto della dignità della persona</li> <li>B. Non necessita di prescrizione medica in quanto è sufficiente il giudizio clinico-assistenziale dell'infermiere per procedere all'attivazione</li> <li>C. Deve essere sempre messa in atto per garantire la protezione degli assistiti in stato di agitazione psico-motoria in quanto non esistono strategie che ne consentano la prevenzione</li> <li>D. Tutte le precedenti</li> </ul>	
11	<p>La rimozione e sostituzione del catetere venoso periferico va effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Ogni 24 ore</li> <li>B. Su richiesta della persona assistita</li> <li>C. In presenza di medicazione sporca</li> <li>D. In presenza di flogosi locale</li> </ul>	
12	<p>I criteri che indicano una buona funzionalità della pervietà del CVC (Catetere Venoso Centrale) sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. E' possibile iniettare facilmente</li> <li>B. E' possibile aspirare sangue facilmente</li> <li>C. La persona assistita non segnala alterazioni o sensazioni dolorose durante il lavaggio/infusione</li> <li>D. Tutte le risposte sono corrette</li> </ul>	

	<b>Quesito</b>	<b>Riportare risposta corretta</b>
13	<p>Quale tra le seguenti indicazioni per la ginnastica vescicale è appropriata in paziente portatore di catetere vescicale?</p> <p>A. La ginnastica vescicale non è raccomandata</p> <p>B. La ginnastica vescicale è raccomandata e va effettuata prima della rimozione del catetere ad intervalli superiori a due ore</p> <p>C. La ginnastica vescicale non è raccomandata se viene effettuata ad intervalli inferiori a due ore</p> <p>D. La ginnastica vescicale va sempre effettuata in quanto riduce il rischio che la persona assistita possa presentare ritenzione urinaria dopo la rimozione del catetere</p>	
14	<p>Quale tra le seguenti affermazioni, in merito alla gestione della PEG (Gastrostomia Endoscopica Percutanea), si ritiene sia corretta:</p> <p>A. Detergere e disinfettare la cute peristomale quotidianamente per la prima settimana dal posizionamento; in seguito sarà sufficiente detergere la zona peristomale con acqua e sapone neutro e mantenere asciutta la zona peristomale per evitare macerazione.</p> <p>B. Medicare “a piatto” con medicazione impermeabile per la prima settimana dal posizionamento</p> <p>C. Mobilizzare la sonda con movimenti di rotazione e di intensa trazione, per prevenire eventuali sue incarcerazioni</p> <p>D. Tenere coperta la PEG con garze sterili per le prime 72 ore dopo la sua applicazione, nei giorni a seguire non è necessario disinfettare la cute e controllare eventuali alterazioni della zona peristomale</p>	
15	<p>Secondo la Legge 8 marzo 2017, n. 24 <i>“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”</i>, gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto a:</p> <p>A. Raccomandazioni previste dalle linee guida [...] elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie [...]</p> <p>B. Alle buone pratiche clinico-assistenziali in mancanza delle raccomandazioni previste dalle linee guida [...]</p> <p>C. Le risposte A e B sono entrambe corrette</p> <p>D. Nessuna delle precedenti</p>	

	<b>Quesito</b>	<b>Riportare risposta corretta</b>
16	<p>Individui gli interventi di educazione sanitaria da prevedere nel piano di dimissione ad un paziente in terapia immunosoppressiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Istruire la persona assistita circa le modalità e i tempi di assunzione del farmaco</li> <li>B. Istruire la persona assistita circa i potenziali rischi legati all'assunzione del farmaco</li> <li>C. Istruire la persona assistita circa le possibili interazioni con altri farmaci e alimenti</li> <li>D. Tutte le risposte sono corrette</li> </ul>	
17	<p>L'Infermiere è tenuto a rispettare la volontà della persona assistita di NON voler essere informata sul proprio stato di salute (art. 20 del Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche 2019)?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Sì, se l'informazione rifiutata è però necessaria per la salute di soggetti terzi, l'Infermiere si adopera a responsabilizzare l'assistito fornendo le informazioni relative al rischio e alla condotta potenzialmente lesiva</li> <li>B. Sì poiché l'informazione è di competenza medica</li> <li>C. No se ciò costituisce una decisione poco autodeterminata</li> <li>D. Sì sempre</li> </ul>	
18	<p>Tra i requisiti essenziali per la costruzione delle Linee Guida si riconoscono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. La valutazione rigorosa delle fonti attraverso una revisione sistematica della letteratura</li> <li>B. La multidisciplinarietà del gruppo di lavoro con il coinvolgimento di membri rappresentanti gli assistiti o i caregiver; nonché la programmazione di consultazioni regolari con gli stakeholders</li> <li>C. La chiara esplicitazione dei livelli delle evidenze e della forza delle raccomandazioni</li> <li>D. Tutte le precedenti</li> </ul>	
19	<p>Nella norma n. 219 del 22 dicembre 2017 "Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento", si specifica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere revocate in qualsiasi momento</li> <li>B. Le disposizioni anticipate di trattamento sono obbligatorie</li> <li>C. Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere registrate esclusivamente in presenza delle forze dell'Ordine</li> <li>D. Le disposizioni anticipate di trattamento perdono di valore se la persona è incosciente</li> </ul>	



<b>Quesito</b>		<b>Riportare risposta corretta</b>
20	<p>Che cosa è lo stomacare?</p> <p>A. Si definisce stomacare l'igiene, l'apparecchiatura della stomia e l'educazione dell'assistito alla gestione della stomia</p> <p>B. Si definisce stomacare la valutazione prechirurgica dell'area in cui apparecchiare la stomia</p> <p>C. Si definisce stomacare il lavaggio del moncone stomale</p> <p>D. Si definisce stomacare la protezione gastrica in caso di terapia con farmaci antiinfiammatori</p>	
21	<p><b>Indicare 6 i fattori di rischio che possono condurre alla caduta accidentale in ambito assistenziale</b></p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	
22	<p><b>Indicare 4 principali manifestazioni cliniche del paziente con pneumotorace</b></p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	

23	<p><b>Il lavaggio delle mani può essere sociale, antisettico e chirurgico. Cosa differenzia i vari tipi di lavaggio</b></p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
24	<p><b>Tradurre o restituire il significato della seguente frase</b></p> <p>At the airport there was an enormous queue. I began to worry that I might miss my flight. I had to run to gate 48 and I arrived completely out of breath</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
25	<p><b>Cosa si intende per LOGOUT?</b></p> <p>-----</p> <p>-----</p>

# PROVA SCRITTA I

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI

PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 10 POSTI

DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CATEGORIA D

	<b>Quesito</b>	<b>Riportare risposta corretta</b>
1	<p>La valvola di Heimlich è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Una valvola ad acqua</li> <li>B. Una valvola unidirezionale</li> <li>C. Una valvola bidirezionale</li> <li>D. Uno strumento utile per la pervietà delle vie aeree</li> </ul>	
2	<p>Cosa significa disfagia?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Deglutizione difficoltosa</li> <li>B. Articolazione difficile della parola</li> <li>C. Impossibilità assoluta al passaggio del cibo nell'esofago</li> <li>D. Dolore crampiforme retrosternale</li> </ul>	
3	<p>In presenza di paziente iperteso in terapia orale, quale nutriente va limitato?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Zuccheri</li> <li>B. Glutine</li> <li>C. Sodio</li> <li>D. Lattosio</li> </ul>	
4	<p>Quali sono gli "ausili" facilitanti la movimentazione delle persone assistite?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Carrozzine</li> <li>B. Materassi anti decubito, ciambelle, sollevatore</li> <li>C. Sollevatori, teli ad alto scorrimento, cintura ergonomica</li> <li>D. Lenzuolo, cintura ergonomica, barella</li> </ul>	
5	<p>Il respiro agonico (gasping) si presenta come:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Respiro irregolare, gradualmente più veloce e profondo, poi lento e superficiale, per arrivare a periodi di apnea fino anche a 60 secondi</li> <li>B. Respiro irregolare, superficiale</li> <li>C. Respiro regolare superficiale molto rapido</li> <li>D. Respiro caratterizzato da una riduzione estrema della frequenza degli atti respiratori fino al loro totale arresto</li> </ul>	
6	<p>L'arteria polmonare trae origine da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Atrio destro</li> <li>B. Atrio sinistro</li> <li>C. Ventricolo sinistro</li> <li>D. Ventricolo destro</li> </ul>	
7	<p>Ad un paziente sono prescritti 35 milligrammi di furosemide. Sono disponibili soluzioni da 100 millilitri all'1%. Quanti millilitri si devono somministrare?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. 10 millilitri</li> <li>B. 350 millilitri</li> <li>C. 3,5 millilitri</li> <li>D. 35 millilitri</li> </ul>	

	<b>Quesito</b>	<b>Riportare risposta corretta</b>
8	<p>L'infermiere, come descritto all'interno del profilo professionale, agisce sia individualmente che in collaborazione con altri operatori sanitari e sociali. Con particolare riferimento alla figura dell'operatore di supporto, l'infermiere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto</li> <li>B. Si avvale dell'opera del personale di supporto limitatamente alle attività che concernono l'area alberghiera</li> <li>C. Si avvale dell'opera del personale di supporto solo in assenza di altro personale infermieristico</li> <li>D. Nessuna delle precedenti</li> </ul>	
9	<p>In caso di rottura di una fiala di farmaco stupefacente è necessario procedere nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Eliminare la fiala rotta apponendo la registrazione sull'apposito registro</li> <li>B. Registrare il prelievo della fiala segnalando una nota relativa all'evento controfirmata da un secondo operatore presente</li> <li>C. L'infermiere denuncia l'evento alla farmacia</li> <li>D. Registrare la fiala prelevata come fosse stata somministrata</li> </ul>	
10	<p>La contenzione fisica, quale atto di restrizione intenzionale dei movimenti o del comportamento volontario di una persona mediante mezzi fisici, è una procedura che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Deve essere considerata come atto eccezionale, finalizzato al bene della persona ed effettuato nel rispetto della dignità della persona</li> <li>B. Non necessita di prescrizione medica in quanto è sufficiente il giudizio clinico-assistenziale dell'infermiere per procedere all'attivazione</li> <li>C. Deve essere sempre messa in atto per garantire la protezione degli assistiti in stato di agitazione psico-motoria in quanto non esistono strategie che ne consentano la prevenzione</li> <li>D. Tutte le precedenti</li> </ul>	
11	<p>La rimozione e sostituzione del catetere venoso periferico va effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Ogni 24 ore</li> <li>B. Su richiesta della persona assistita</li> <li>C. In presenza di medicazione sporca</li> <li>D. In presenza di flogosi locale</li> </ul>	
12	<p>I criteri che indicano una buona funzionalità della pervietà del CVC (Catetere Venoso Centrale) sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. E' possibile iniettare facilmente</li> <li>B. E' possibile aspirare sangue facilmente</li> <li>C. La persona assistita non segnala alterazioni o sensazioni dolorose durante il lavaggio/infusione</li> <li>D. Tutte le risposte sono corrette</li> </ul>	


	<b>Quesito</b>	<b>Riportare risposta corretta</b>
13	<p>Quale tra le seguenti indicazioni per la ginnastica vescicale è appropriata in paziente portatore di catetere vescicale?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. La ginnastica vescicale non è raccomandata</li> <li>B. La ginnastica vescicale è raccomandata e va effettuata prima della rimozione del catetere ad intervalli superiori a due ore</li> <li>C. La ginnastica vescicale non è raccomandata se viene effettuata ad intervalli inferiori a due ore</li> <li>D. La ginnastica vescicale va sempre effettuata in quanto riduce il rischio che la persona assistita possa presentare ritenzione urinaria dopo la rimozione del catetere</li> </ul>	
14	<p>Quale tra le seguenti affermazioni, in merito alla gestione della PEG (Gastrostomia Endoscopica Percutanea), si ritiene sia corretta?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Detergere e disinfettare la cute peristomale quotidianamente per la prima settimana dal posizionamento; in seguito sarà sufficiente detergere la zona peristomale con acqua e sapone neutro e mantenere asciutta la zona peristomale per evitare macerazione.</li> <li>B. Medicare “a piatto” con medicazione impermeabile per la prima settimana dal posizionamento</li> <li>C. Mobilizzare la sonda con movimenti di rotazione e di intensa trazione, per prevenire eventuali sue incarcerazioni</li> <li>D. Tenere coperta la PEG con garze sterili per le prime 72 ore dopo la sua applicazione, nei giorni a seguire non è necessario disinfettare la cute ne controllare eventuali alterazioni della zona peristomale</li> </ul>	
15	<p>Secondo la Legge 8 marzo 2017, n. 24 <i>“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”</i>, gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. raccomandazioni previste dalle linee guida [...] elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie [...]</li> <li>B. alle buone pratiche clinico-assistenziali in mancanza delle raccomandazioni previste dalle linee guida [...]</li> <li>C. Le risposte A e B sono entrambe corrette</li> <li>D. Nessuna delle precedenti</li> </ul>	

	<b>Quesito</b>	<b>Riportare risposta corretta</b>
16	<p>Individui gli interventi di educazione sanitaria da prevedere nel piano di dimissione ad un paziente in terapia immunosoppressiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Istruire la persona assistita circa le modalità e i tempi di assunzione del farmaco</li> <li>B. Istruire la persona assistita circa i potenziali rischi legati all'assunzione del farmaco</li> <li>C. Istruire la persona assistita circa le possibili interazioni con altri farmaci e alimenti</li> <li>D. Tutte le risposte sono corrette</li> </ul>	
17	<p>L'Infermiere è tenuto a rispettare la volontà della persona assistita di NON voler essere informata sul proprio stato di salute (art. 20 del Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche 2019)?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Sì, se l'informazione rifiutata è però necessaria per la salute di soggetti terzi, l'Infermiere si adopera a responsabilizzare l'assistito fornendo le informazioni relative al rischio e alla condotta potenzialmente lesiva</li> <li>B. Sì poiché l'informazione è di competenza medica</li> <li>C. No se ciò costituisce una decisione poco autodeterminata</li> <li>D. Sì sempre</li> </ul>	
18	<p>Tra i requisiti essenziali per la costruzione delle Linee Guida si riconoscono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. La valutazione rigorosa delle fonti attraverso una revisione sistematica della letteratura</li> <li>B. La multidisciplinarietà del gruppo di lavoro con il coinvolgimento di membri rappresentanti gli assistiti o i caregiver; nonché la programmazione di consultazioni regolari con gli stakeholders</li> <li>C. La chiara esplicitazione dei livelli delle evidenze e della forza delle raccomandazioni</li> <li>D. Tutte le precedenti</li> </ul>	
19	<p>Nella norma n. 219 del 22 dicembre 2017 "Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento", si specifica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere revocate in qualsiasi momento</li> <li>B. Le disposizioni anticipate di trattamento sono obbligatorie</li> <li>C. Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere registrate esclusivamente in presenza delle forze dell'Ordine</li> <li>D. Le disposizioni anticipate di trattamento perdono di valore se la persona è incosciente</li> </ul>	

20	<p>Che cosa è lo stomacare?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Si definisce stomacare l'igiene, l'apparecchiatura della stomia e l'educazione dell'assistito alla gestione della stomia</li> <li>B. Si definisce stomacare la valutazione prechirurgica dell'area in cui apparecchiare la stomia</li> <li>C. Si definisce stomacare il lavaggio del moncone stomale</li> <li>D. Si definisce stomacare la protezione gastrica in caso di terapia con farmaci antiinfiammatori</li> </ul>	A
21	<p><b>Indicare 6 pratiche assistenziali per la prevenzione delle lesioni da pressione</b></p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
22	<p><b>Indicare 4 principali manifestazioni cliniche del paziente con scompenso cardiaco</b></p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	



23	<p><b>Il lavaggio delle mani può essere sociale, antisettico e chirurgico. Cosa differenzia i vari tipi di lavaggio</b></p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
24	<p><b>Tradurre o restituire il significato della seguente frase</b></p> <p>At the age of 54 Martha Jones gave up her job as a psychotherapist, gave away all her money and her flat and threw away her credit cards: apart a few personal belongings, she doesn't own anything. She has lived without money for the last ten years, and has written a book about her experience called " My life without money"</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
25	<p><b>Cosa significa "Zippare" un documento</b></p> <p>-----</p> <p>-----</p>



# CORRETTORE PROVA SCRITTA A

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI

PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 10 POSTI

DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CATEGORIA D

	Quesito	Riportare risposta corretta
1	<p>La valutazione neurologica con la Glasgow Coma Scale prevede:</p> <p>A. La valutazione di apertura occhi, la risposta verbale, la risposta motoria</p> <p>B. La valutazione di apertura occhi, la risposta verbale e la valutazione dell'udito</p> <p>C. La valutazione della chiusura degli occhi, la risposta verbale e la risposta sensitiva</p> <p>D. La valutazione dell'apertura della bocca, la risposta motoria e la risposta sensitiva</p>	A
2	<p>Un assistito con la presenza di <i>Staphylococcus aureus</i> meticillino-resistente nell'espettorato, tramite quale via di trasmissione può essere fonte di contagio?</p> <p>A. Ematica</p> <p>B. Oro-fecale</p> <p>C. Aerea</p> <p>D. Droplet e contatto</p>	D
3	<p>Quale fra le seguenti è la via di nutrizione artificiale più fisiologica:</p> <p>A. Nutrizione parenterale</p> <p>B. Nutrizione enterale</p> <p>C. Nessuna delle due</p> <p>D. Indifferentemente A e B</p>	B
4	<p>Durante il trasferimento letto-carrozzina di una persona assistita che presenta emiplegia all'emilato destro, la carrozzina deve essere posizionata:</p> <p>A. Dal lato plegico della persona assistita</p> <p>B. Dal lato sano della persona assistita</p> <p>C. Perpendicolare al lato destro del letto</p> <p>D. Parallela al lato plegico della persona assistita</p>	B
5	<p>L'anisocoria è:</p> <p>A. La differente ampiezza del diametro delle pupille</p> <p>B. La perdita della capacità di parlare</p> <p>C. L'incapacità di scrivere</p> <p>D. La mancata coordinazione nell'esecuzione dei movimenti</p>	A
6	<p>E' possibile somministrare una sacca di emocomponenti gruppo 0 Rh negativo ad un paziente di gruppo:</p> <p>A. Gruppo A Rh positivo</p> <p>B. Gruppo A Rh negativo</p> <p>C. Gruppo B Rh negativo</p> <p>D. Tutte le precedenti</p>	D

	Quesito	Riportare risposta corretta
7	<p>Aspirando in una siringa 6 millilitri di una soluzione di lidocaina al 2%, quanti milligrammi di lidocaina saranno presenti nel liquido aspirato?</p> <p>A. 120 milligrammi            B. 1200 milligrammi            C. 0,12 milligrammi            D. 12 milligrammi</p>	A
8	<p>Secondo il comma 3 dell'articolo 1 del Decreto 14 settembre 1994, n. 739 "Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere", è previsto che l'infermiere:</p> <p>A. Garantisca la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche            B. Garantisca la corretta esecuzione degli ordini del medico            C. Garantisca esclusivamente la corretta applicazione delle prescrizioni farmacologiche            D. Nessuna delle precedenti</p>	A
9	<p>La persona assistita rientra in degenza dalla Sala Operatoria con un'infusione di morfina. Quale delle seguenti valutazioni potrebbe indicare un effetto avverso alla terapia con oppioidi?</p> <p>A. Punteggio dolore 3/10 scala NRS (Numeric Rating Scale)            B. Creatininemia alta            C. Oliguria            D. Bradipnea</p>	D
10	<p>La rilevazione del dolore di un assistito adulto da parte dell'infermiere deve essere svolta:</p> <p>A. Esclusivamente all'ingresso in degenza ed in fase di dimissione            B. Almeno due volte al giorno e dopo ogni intervento di terapia antalgica, registrando il dato in cartella clinica            C. Solo se l'assistito segnala spontaneamente la presenza di dolore            D. Dopo 60 minuti dalla somministrazione parenterale di un farmaco e dopo 30 minuti dalla somministrazione enterale di un farmaco</p>	B
11	<p>Quando si effettua il prelievo di sangue tramite catetere venoso periferico quale dispositivo di protezione individuale si deve indossare:</p> <p>A. Guanti sterili            B. Guanti puliti            C. Camice sterile            D. Nessun dispositivo</p>	B

94

	Quesito	Riportare risposta corretta
12	<p>Nella corretta gestione del CVC (Catetere Venoso Centrale) la sostituzione delle linee infusionali deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Con tecnica asettica</li> <li>B. Non più frequentemente di 96 ore per le infusioni continue</li> <li>C. Ogni 24 ore per le nutrizioni parenterali totali</li> <li>D. Tutte le risposte sono corrette</li> </ul>	<p style="text-align: right;">95</p> <p style="text-align: center;">D</p>
13	<p>Per la corretta gestione di un catetere vescicale è indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Disconnettere il circuito durante il trasporto del paziente</li> <li>B. Eseguire lavaggi vescicali a circuito aperto</li> <li>C. Utilizzare tecniche asettiche durante l'inserimento</li> <li>D. Chiudere il catetere per la ginnastica vescicale</li> </ul>	<p style="text-align: center;">C</p>
14	<p>La somministrazione della Nutrizione Enterale attraverso la PEG (Gastrostomia Endoscopica Percutanea) può iniziare solo dopo 24 ore dal confezionamento. La miscela nutritiva può essere somministrata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Attraverso un bolo unico (circa 200-400C) attraverso una siringa con tecnica "gavage"</li> <li>B. In infusione intermittente, durante la giornata la miscela viene suddivisa in porzioni uguali e viene somministrata in 3-6 volte</li> <li>C. In maniera continua, 24 ore su 24, con pompa infusione</li> <li>D. Tutte le risposte precedenti</li> </ul>	<p style="text-align: center;">D</p>
15	<p>Quale dei seguenti passaggi appartiene all'articolo 5 della Legge 8 marzo 2017, n°24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie", anche conosciuta come Legge Gelli Bianco?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie [...], si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida [...]</li> <li>B. [...] in mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico assistenziali</li> <li>C. Tutte le risposte precedenti appartengono all'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n°24 Gelli-Bianco</li> <li>D. Nessuna delle risposte precedenti appartengono all'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n°24 Gelli-Bianco</li> </ul>	<p style="text-align: center;">C</p>

	Quesito	Riportare risposta corretta
16	<p>Secondo l'articolo 7 del Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati (Regolamento (UE) 2016/679) tra le condizioni per il consenso figurano:</p> <p>A. se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. [...]</p> <p>B. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di prestare il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.</p> <p>C. Le risposte A e B sono entrambe corrette</p> <p>D. Nessuna delle precedenti</p>	C
17	<p>L'art. 3 del Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche 2019 relativamente al "RISPETTO E ALLA NON DISCRIMINAZIONE" precisa quanto segue?</p> <p>A. L'Infermiere cura e si prende cura della persona assistita, nel rispetto della dignità, della libertà, dell'eguaglianza, delle sue scelte di vita e concezione di salute e benessere, senza alcuna distinzione sociale, di genere, di orientamento della sessualità, etnica, religiosa e culturale</p> <p>B. L'Infermiere si astiene da ogni forma di discriminazione e colpevolizzazione nei confronti di tutti coloro che incontra nel suo operare</p> <p>C. L'Infermiere si affida al metodo del buon padre di famiglia</p> <p>D. Le affermazioni al punto A e B sono entrambe corrette</p>	D
18	<p>Alla dimissione dell'assistito dall'Unità Operativa (UO) di degenza, la documentazione clinico-assistenziale:</p> <p>A. Deve essere conservata nell'UO di riferimento per almeno un anno e successivamente archiviata</p> <p>B. Deve essere consegnata all'assistito, o al suo caregiver, in quanto riconosciuto come possessore legittimo dei dati sensibili in essa contenuti</p> <p>C. Deve essere conservata illimitatamente in appositi archivi autonomi dell'azienda</p> <p>D. Non deve essere conservata</p>	C

96

	Quesito	Riportare risposta corretta
19	<p>Fra i principi basilari della norma n. 219 del 22 dicembre 2017 “Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento”, vi è:</p> <p>A. La tutela contro gli atti di violenza            B. La tutela del diritto alla autodeterminazione            C. La tutela del diritto alla privacy            D. La tutela dei beni personali della persona in Ospedale</p>	B
20	<p>Quando va eseguita l’antisepsi cutanea e la tricotomia preoperatoria?</p> <p>A. Eseguire l’antisepsi cutanea almeno la sera prima dell’intervento e la tricotomia immediatamente prima dell’intervento            B. Eseguire l’antisepsi cutanea e la tricotomia al domicilio almeno 24 ore prima dell’ingresso in ospedale            C. Non è raccomandato procedere all’antisepsi cutanea pre chirurgica            D. Nessuna delle precedenti</p>	A
21	<p><b>Indicare 6 principali aspetti-funzioni da monitorare nel paziente chirurgico nelle prime 4-6 ore dopo l’intervento chirurgico</b></p> <p><b>Stato di coscienza (agitazione e delirio):</b> il controllo dello stato di coscienza fa parte, assieme alla verifica dei parametri cardiovascolari e respiratori della valutazione postoperatoria (PO). L’insorgenza di uno stato confusionale acuto PO è una condizione clinica associata a un aumento della mortalità, a complicanze PO e ad aumento della durata della degenza.</p> <p><b>Funzione respiratoria:</b> l’ipossiemia è uno degli eventi più temuti. I pazienti con anestesia prolungata e/o sottoposti a chirurgia toracica/polmonare, anziani, fumatori, obesi e affetti da patologie polmonari sono maggiormente a rischio di sviluppare complicanze polmonari. Questi pazienti richiedono un monitoraggio della funzionalità respiratoria addizionale, mobilitazione precoce e ginnastica respiratoria.</p> <p><b>Funzione cardiovascolare:</b> la maggior parte degli eventi avversi della funzione cardiovascolare si verifica entro le due ore successive all’intervento chirurgico e sono rappresentati da fenomeni aritmici ed emodinamici (ipotensione, ipertensione).</p> <p><b>Termoregolazione:</b> la principale causa di insorgenza del brivido postoperatorio è rappresentata dalla risposta termoregolatrice all’ipotermia postoperatoria. Il mantenimento della normotermia rappresenta l’evento cardine per la prevenzione e il trattamento del brivido PO.</p> <p><b>Dolore:</b> un dolore PO scarsamente controllato comporta gravi conseguenze di ordine psicologico e fisiologico: riduzione della mobilità, aumento della morbilità, aumentati tempi di degenza e peggioramento della qualità di vita.</p> <p><b>Minzione:</b> la minzione dovrebbe avvenire dopo 4-6 ore dall’ultima minzione o dalla</p>	

97

	<p>rimozione del catetere vescicale. La presenza di globo vescicale a livello sovrapubico, dolore addominale basso e/o stato di agitazione possono segnalare la presenza di ritenzione urinaria acuta.</p> <p><b>Drenaggi chirurgici:</b> la valutazione dei drenaggi permette la rapida intercettazione dell'insorgere di complicanze come il sanguinamento e riduce gli esiti avversi. I drenaggi vanno rimossi precocemente per ridurre il rischio di infezione.</p> <p><b>Diuresi e bilancio idroelettrolitico:</b> lo stato volemico, l'equilibrio elettrolitico e la diuresi devono essere valutati attentamente durante la degenza, soprattutto nei pazienti sottoposti ad interventi di chirurgia maggiore e/o con concomitanti patologie cardiovascolari o metaboliche (es. diabete). Nel paziente anziano, occorre un'attenzione ancora maggiore, in quanto la capacità di mantenere un'omeostasi corretta è ulteriormente ridotta e cresce il rischio di sviluppare complicanze legate ad una ridotta funzionalità cardiaca, respiratoria o renale.</p> <p><b>Emorragie ematomi</b></p> <p><i>PUNTI 1 PER OGNI AFFERMAZIONE CORRETTA</i></p>
22	<p><b>Indicare 6 principali manifestazioni cliniche presenti nel paziente con trauma cranico</b></p> <p>afasia transitoria o permanente (a seconda della gravità del danno)          Disturbi visivi (vista indistinta o sdoppiata)          Cefalea          Pallore          Diaforesi          Otorrea o rinorrea          Disorientamento          Alterazione della funzione respiratoria          Tachicardia</p> <p>Segni di aumento della pressione intracranica (vomito a getto, cefalea, modificazioni pupillari, compromissione dello stato di coscienza, compromissione motoria, triade di cushing [bradicardia_bradipnea_ipertensione] diabete insipido ( poliuria, polidipsia, osmolarità urinaria inferiore a quella plasmatica), crisi epilettiche</p> <p><i>PUNTI 1 PER OGNI AFFERMAZIONE CORRETTA</i></p>
23	<p><b>Indicare 4 vantaggi che offre lo strofinamento alcolico rispetto al lavaggio mani</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-sempre disponibile ed a portata di mano</li> <li>-velocità nell'esecuzione</li> <li>-aumentata efficacia</li> <li>-protezione della cute/presenza sostanze emollienti</li> <li>-minor rischio di ICA</li> </ul> <p><i>PUNTI 2 PER OGNI AFFERMAZIONE CORRETTA</i></p>



24	<p><b>Tradurre in italiano o descrivere il significato della seguente frase</b></p> <p>What does a lack of sleep do to us? As well as making us irritable and unhappy as people it also reduces our motivation and ability to work. This has serious implications for society in general. Doctors and nurses, for example, are often chronically sleep deprived especially when they are on “night call” and may get less than three hours’ sleep.</p> <p>Cosa ci provoca la mancanza di sonno? Oltre che a renderci irritabili e infelici come persone riduce anche la nostra motivazione e capacità di lavorare. Ciò comporta gravi implicazioni per la società in generale.</p> <p>Medici e Infermieri, per esempio, sono spesso cronicamente deprivati di sonno specialmente quando sono reperibili di notte e possono arrivare a dormire anche meno di tre ore.</p>
25	<p><b>Quali sono i principali programmi di posta elettronica?</b></p> <p><b>E’ possibile impostare qualche opzione specifica per l’invio del messaggio?</b></p> <p>Priorità d’invio</p> <p>Ritardo d’invio</p> <p>Tracciare la consegna</p>

99



100

# CORRETTORE PROVA SCRITTA B

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI

PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 10 POSTI

DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CATEGORIA D

	Quesito	Riportare risposta corretta
1	<p>La maschera Venturi, escludendo l'uso per tracheostomia, permette l'erogazione valori variabili di FiO<sub>2</sub> ovvero:</p> <p>A. Dal 24% al 60%</p> <p>B. Dal 15% al 30%</p> <p>C. Dal 70 % al 100%</p> <p>D. Dal 95% al 99%</p>	A
2	<p>Per isolamento si intende:</p> <p>A. La separazione di un paziente dall'ambiente esterno e l'abolizione di qualsiasi contatto</p> <p>B. L'adozione di precauzioni aggiuntive per l'isolamento dei germi</p> <p>C. Una misura di profilassi delle malattie infettive</p> <p>D. Tutte le precedenti</p>	D
3	<p>In presenza di celiachia, qual è il principale nutriente da eliminare dalla propria alimentazione?</p> <p>A. Fosforo</p> <p>B. Glutine</p> <p>C. Sodio</p> <p>D. Lattosio</p>	B
4	<p>Durante il trasferimento letto-carrozzina di una persona assistita che presenta emiplegia all'emilato destro, la carrozzina deve essere posizionata:</p> <p>A. Dal lato plegico della persona assistita</p> <p>B. Dal lato sano della persona assistita</p> <p>C. Perpendicolare al lato destro del letto</p> <p>D. Parallela al lato plegico della persona assistita</p>	B
5	<p>Per miosi nel paziente adulto si intende:</p> <p>A. La diminuzione del diametro della pupilla</p> <p>B. Un'alterazione del miocardio su base infiammatoria</p> <p>C. La differente ampiezza del diametro delle pupille</p> <p>D. Una condizione in cui il diametro della pupilla supera i 5 millimetri</p>	A
6	<p>E' possibile somministrare una sacca di emocomponenti gruppo 0 Rh positivo ad un paziente di gruppo:</p> <p>A. Gruppo 0 Rh negativo</p> <p>B. Gruppo A Rh positivo</p> <p>C. Gruppo A Rh negativo</p> <p>D. Gruppo B Rh negativo</p>	B
7	<p>Quanti milligrammi di principio attivo si trovano in un millilitro di soluzione all'1%?</p> <p>A. 0,1 milligrammi</p> <p>B. 10 milligrammi</p> <p>C. 1 milligrammo</p> <p>D. 100 milligrammi</p>	B

	Quesito	Riportare risposta corretta
8	<p>Secondo la Legge 26 febbraio 1999, n. 42 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie", il profilo professionale determina il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie insieme agli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post base</li> <li>B. Specifici codici deontologici</li> <li>C. Le risposte A e B sono entrambe corrette</li> <li>D. Nessuna delle precedenti</li> </ul>	C
9	<p>Quale dei seguenti farmaci è un antagonista dell'insulina?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Glucagone</li> <li>B. Pralidossima</li> <li>C. Solfato di Protamina</li> <li>D. Naloxone</li> </ul>	A
10	<p>La rilevazione del dolore di un assistito adulto da parte dell'infermiere deve essere svolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Esclusivamente all'ingresso in degenza ed in fase di dimissione</li> <li>B. Almeno due volte al giorno e dopo ogni intervento di terapia antalgica, registrando il dato in cartella clinica</li> <li>C. Solo se l'assistito segnala spontaneamente la presenza di dolore</li> <li>D. Dopo 60 minuti dalla somministrazione parenterale di un farmaco e dopo 30 minuti dalla somministrazione enterale di un farmaco</li> </ul>	B
11	<p>Quando si effettua il prelievo di sangue tramite catetere venoso periferico quale dispositivo di protezione individuale si deve indossare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Guanti sterili</li> <li>B. Guanti puliti</li> <li>C. Camice sterile</li> <li>D. Nessun dispositivo</li> </ul>	B
12	<p>Nella corretta gestione del CVC (Catetere Venoso Centrale) la sostituzione delle linee infusionali deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Con tecnica asettica</li> <li>B. Non più frequentemente di 96 ore per le infusioni continue</li> <li>C. Ogni 24 ore per le nutrizioni parenterali totali</li> <li>D. Tutte le risposte sono corrette</li> </ul>	D
13	<p>Per la corretta gestione di un catetere vescicale è indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Disconnettere il circuito durante il trasporto del paziente</li> <li>B. Eseguire lavaggi vescicali a circuito aperto</li> <li>C. Utilizzare tecniche asettiche durante l'inserimento</li> <li>D. Chiudere il catetere per la ginnastica vescicale</li> </ul>	C

	Quesito	Riportare risposta corretta
14	<p>La somministrazione della Nutrizione Enterale attraverso la PEG (Gastrostomia Endoscopica Percutanea) può iniziare solo dopo 24 ore dal confezionamento. La miscela nutritiva può essere somministrata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Attraverso un bolo unico (circa 200-400C) attraverso una siringa con tecnica "gavage"</li> <li>B. In infusione intermittente, durante la giornata la miscela viene suddivisa in porzioni uguali e viene somministrata in 3-6 volte</li> <li>C. In maniera continua, 24 ore su 24, con pompa infusione</li> <li>D. Tutte le risposte precedenti</li> </ul>	D
15	<p>Quale dei seguenti passaggi appartiene all'articolo 5 della Legge 8 marzo 2017, n°24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie", anche conosciuta come Legge Gelli Bianco?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie [...], si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida [...]</li> <li>B. [...] in mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico assistenziali</li> <li>C. Tutte le risposte precedenti appartengono all'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n°24 Gelli-Bianco</li> <li>D. Nessuna delle risposte precedenti appartengono all'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n°24 Gelli-Bianco</li> </ul>	C
16	<p>Secondo l'articolo 7 del Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati (Regolamento (UE) 2016/679) tra le condizioni per il consenso figurano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. [...]</li> <li>B. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di prestare il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.</li> <li>C. Le risposte A e B sono entrambe corrette</li> <li>D. Nessuna delle precedenti</li> </ul>	C

	Quesito	Riportare risposta corretta
17	<p>L'art. 3 del Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche 2019 relativamente al "RISPETTO E ALLA NON DISCRIMINAZIONE" precisa quanto segue?</p> <p>A. L'Infermiere cura e si prende cura della persona assistita, nel rispetto della dignità, della libertà, dell'eguaglianza, delle sue scelte di vita e concezione di salute e benessere, senza alcuna distinzione sociale, di genere, di orientamento della sessualità, etnica, religiosa e culturale</p> <p>B. L'Infermiere si astiene da ogni forma di discriminazione e colpevolizzazione nei confronti di tutti coloro che incontra nel suo operare</p> <p>C. L'Infermiere si affida al metodo del buon padre di famiglia</p> <p>D. Le affermazioni al punto A e B sono entrambe corrette</p>	D
18	<p>Alla dimissione dell'assistito dall'Unità Operativa (UO) di degenza, la documentazione clinico-assistenziale:</p> <p>A. Deve essere conservata nell'UO di riferimento per almeno un anno e successivamente archiviata</p> <p>B. Deve essere consegnata all'assistito, o al suo caregiver, in quanto riconosciuto come possessore legittimo dei dati sensibili in essa contenuti</p> <p>C. Deve essere conservata illimitatamente in appositi archivi autonomi all'interno dell'azienda</p> <p>D. Non deve essere conservata</p>	C
19	<p>Fra i principi basilari della norma n. 219 del 22 dicembre 2017 "Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento", vi è:</p> <p>A. La tutela contro gli atti di violenza</p> <p>B. La tutela del diritto alla autodeterminazione</p> <p>C. La tutela del diritto alla privacy</p> <p>D. La tutela dei beni personali della persona in Ospedale</p>	B
20	<p>Quando va eseguita l'antisepsi cutanea e la tricotomia preoperatoria?</p> <p>A. Eseguire l'antisepsi cutanea almeno la sera prima dell'intervento e la tricotomia immediatamente prima dell'intervento</p> <p>B. Eseguire l'antisepsi cutanea e la tricotomia al domicilio almeno 24 ore prima dell'ingresso in ospedale</p> <p>C. Non è raccomandato procedere all'antisepsi cutanea pre chirurgica</p> <p>D. Nessuna delle precedenti</p>	A

21	<p><b>Indicare 6 interventi che devono essere messi in atto al fine di prevenire l'insorgenza di una Trombosi venosa profonda.</b></p> <p>La stasi venosa può causare edemi declivi e trombosi venosa profonda (con conseguente eventuale tromboembolismo).</p> <p>Focus su TVP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• applicare correttamente le calze elastiche antiemboliche</li> <li>• utilizzare dispositivi di compressione pneumatica intermittente o sequenziale</li> <li>• elevazione degli arti</li> <li>• effettuare/far effettuare esercizi per gli arti inferiori (flessione plantare e dorsale dei piedi, flessione/estensione delle ginocchia, sollevamento arto inferiore)</li> <li>• favorire un'adeguata idratazione se non ci sono controindicazioni</li> <li>• evitare posizioni che impediscono il ritorno venoso, evitare vestiario o cuscini che ostacolano il ritorno venoso</li> <li>• somministrare con regolarità l'eparina a basso peso molecolare/monitorare la coagulazione</li> <li>• monitorare/osservare la presenza di segni e sintomi di trombosi venosa profonda (dolore, gonfiore, arrossamento estremità colpita)</li> <li>• schede di valutazione del rischio (TVP) algoritmi di valutazione del rischio</li> <li>• movimentazione precoce</li> <li>• intervento di educazione sanitaria</li> </ul> <p><i>PUNTI 1 PER OGNI AFFERMAZIONE CORRETTA</i></p>
22	<p><b>Indicare 6 principali manifestazioni cliniche del paziente con ictus.</b></p> <p>Di solito si verifica un'improvvisa perdita di coscienza e un deficit neurologico focale, stupore, coma, Vomito, fotofobia, pressione sanguigna elevata, sintomi di aumento della pressione intracranica ( mal di testa, vomito.....) , rigidità del collo, dolore al movimento degli occhi e forte mal di testa, convulsioni, alterazioni delle pupille, atassia, ritenzione o incontinenza urinaria, neglect, disartria, sguardo deviato, afasia, deficit di movimento, emiparesi, emiplegia, disfagia, deficit della coordinazione, convulsioni, bradicardia, deviazione della rima buccale, movimenti involontari, agnosia</p> <p><i>PUNTI 1 PER OGNI AFFERMAZIONE CORRETTA</i></p>
23	<p><b>Indicare 4 vantaggi che offre lo strofinamento alcolico rispetto al lavaggio mani</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-sempre disponibile ed a portata di mano</li> <li>-velocità nell'esecuzione</li> <li>-aumentata efficacia</li> <li>-protezione della cute/presenza sostanze emollienti</li> <li>-minor rischio di ICA</li> </ul> <p><i>PUNTI 2 PER OGNI AFFERMAZIONE CORRETTA</i></p>
24	<p><b>Tradurre in italiano o descrivere il significato delle seguenti frasi</b></p> <p>Sleep tips:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Give sleep a high priority in your life</li> <li>b. Listen to your body. If you feel tired, you probably need more sleep</li> <li>c. Have a regular routine, try to go to bed at roughly the same time every day.</li> <li>d. Make sure your bedroom isn't too hot</li> </ol>

	<p>e. Don't use your bedroom as an office or for watching TV</p> <p>Suggerimenti per dormire:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Dai al dormire una priorità alta nella tua vita</li><li>b. Ascolta il tuo corpo. Se ti senti stanco , probabilmente hai bisogno di dormire di più</li><li>c. Cerca di avere una routine regolare, cerca di andare a letto ogni giorno più o meno alla stessa ora</li><li>d. Assicurati che la tua camera non sia troppo calda</li><li>e. Non usare la tua camera come un ufficio o per vedere la TV</li></ul>
25	<p><b>Qual è il significato dell'acronimo PEC? Che peculiarità ha?</b></p> <p>La Posta Elettronica Certificata (PEC) è il sistema che consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla normativa</p>







107

# CORRETTORE PROVA SCRITTA C

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI

PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 10 POSTI

DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CATEGORIA D

	Quesito	Riportare risposta corretta
1	<p>La maschera facciale per ossigenoterapia Venturi permette:</p> <p>A. L'erogazione di flusso di ossigeno predeterminato</p> <p>B. Di ottenere un FiO<sub>2</sub> (frazione inspiratoria di ossigeno) desiderata grazie all'utilizzo di appositi raccordi</p> <p>C. Di raggiungere un FiO<sub>2</sub> (frazione inspiratoria di ossigeno) fino al 60%</p> <p>D. Tutte le precedenti</p>	D
2	<p>Un infermiere sta spiegando le modalità di trasmissione dell'epatite A ad un collega in addestramento. Qual è la sequenza corretta della catena dell'infezione?</p> <p>A. Soggetto infetto-feci-vettore-apparato gastroenterico</p> <p>B. Soggetto infetto-vettore-circolo ematico-cute lesa</p> <p>C. Soggetto infetto-apparato gastroenterico-trasmissione da contatto-feci</p> <p>D. Trasmissione da contatto -apparato gastroenterico-soggetto infetto</p>	A
3	<p>In presenza di insufficienza renale, i principali nutrienti da monitorare sono:</p> <p>A. Gli zuccheri semplici</p> <p>B. I carboidrati complessi</p> <p>C. Le proteine</p> <p>D. I grassi saturi</p>	C
4	<p>Durante il trasferimento letto-carrozzina di una persona assistita che presenta emiplegia all'emilato destro, la carrozzina deve essere posizionata:</p> <p>A. Dal lato plegico della persona assistita</p> <p>B. Dal lato sano della persona assistita</p> <p>C. Perpendicolare al lato destro del letto</p> <p>D. Parallela al lato plegico della persona assistita</p>	B
5	<p>Per midriasi nel paziente adultosi intende:</p> <p>A. Una condizione in cui il diametro della pupilla supera i 5 millimetri</p> <p>B. La diminuzione del diametro della pupilla</p> <p>C. La differente ampiezza del diametro delle pupille</p> <p>D. Diminuzione della risposta motoria della pupilla alla luce</p>	A
6	<p>Un paziente di gruppo AB Rh positivo può essere trasfuso con emocomponenti di gruppo:</p> <p>A. Gruppo A Rh positivo</p> <p>B. Gruppo A Rh negativo</p> <p>C. Gruppo B Rh negativo</p> <p>D. Tutte le precedenti</p>	D
7	<p>Quanti milligrammi di principio attivo si trovano in 10 millilitri di una soluzione al 2%:</p> <p>A. 20 milligrammi</p> <p>B. 2 milligrammi</p> <p>C. 200 milligrammi</p> <p>D. 0,2 milligrammi</p>	C

	Quesito	Riportare risposta corretta
8	<p>Secondo il comma 4 dell'articolo 1 del Decreto 14 settembre 1994, n. 739 "Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere", l'infermiere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Concorre all'aggiornamento del proprio profilo professionale</li> <li>B. Concorre all'aggiornamento relativo alla ricerca</li> <li>C. Contribuisce alla formazione del personale di supporto</li> <li>D. Tutte le precedenti</li> </ul>	D
9	<p>Secondo la Raccomandazione del Ministero della Salute Raccomandazione n.1 dell'Aprile 2005 "RACCOMANDAZIONE SUL CORRETTO UTILIZZO DELLE SOLUZIONI CONCENTRATE DI CLORURO DI POTASSIO – KCL – ED ALTRE SOLUZIONI CONCENTRATE CONTENENTI POTASSIO" come devono essere conservate le soluzioni concentrate di potassio?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Conservate sui carrelli di terapia pronti all'uso</li> <li>B. In compartimenti/armadi riservati, separati dagli altri medicinali, possibilmente chiusi a chiave e segnalati dalla scritta di allerta "Diluire prima della somministrazione: mortale se infuso non diluito"</li> <li>C. Conservate negli armadi con gli altri principi attivi della stessa forma farmaceutica</li> <li>D. Conservate esclusivamente presso il Pronto Soccorso con gli altri principi attivi della stessa forma farmaceutica</li> </ul>	B
10	<p>La rilevazione del dolore di un assistito adulto da parte dell'infermiere deve essere svolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Esclusivamente all'ingresso in degenza ed in fase di dimissione</li> <li>B. Almeno due volte al giorno e dopo ogni intervento di terapia antalgica, registrando il dato in cartella clinica</li> <li>C. Solo se l'assistito segnala spontaneamente la presenza di dolore</li> <li>D. Dopo 60 minuti dalla somministrazione parenterale di un farmaco e dopo 30 minuti dalla somministrazione enterale di un farmaco</li> </ul>	B
11	<p>Quando si effettua il prelievo di sangue tramite catetere venoso periferico quale dispositivo di protezione individuale si deve indossare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Guanti sterili</li> <li>B. Guanti puliti</li> <li>C. Camice sterile</li> <li>D. Nessun dispositivo</li> </ul>	B
12	<p>Nella corretta gestione del CVC (Catetere Venoso Centrale) la sostituzione delle linee infusionali deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Con tecnica asettica</li> <li>B. Non più frequentemente di 96 ore per le infusioni continue</li> <li>C. Ogni 24 ore per le nutrizioni parenterali totali</li> <li>D. Tutte le risposte sono corrette</li> </ul>	D

	Quesito	Riportare risposta corretta
13	<p>Per la corretta gestione di un catetere vescicale è indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Disconnettere il circuito durante il trasporto del paziente</li> <li>B. Eseguire lavaggi vescicali a circuito aperto</li> <li>C. Utilizzare tecniche asettiche durante l'inserimento</li> <li>D. Chiudere il catetere per la ginnastica vescicale</li> </ul>	C
14	<p>La somministrazione della Nutrizione Enterale attraverso la PEG (Gastrostomia Endoscopica Percutanea) può iniziare solo dopo 24 ore dal confezionamento. La miscela nutritiva può essere somministrata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Attraverso un bolo unico (circa 200-400C) attraverso una siringa con tecnica "gavage"</li> <li>B. In infusione intermittente, durante la giornata la miscela viene suddivisa in porzioni uguali e viene somministrata in 3-6 volte</li> <li>C. In maniera continua, 24 ore su 24, con pompa infusione</li> <li>D. Tutte le risposte precedenti</li> </ul>	D
15	<p>Quale dei seguenti passaggi appartiene all'articolo 5 della Legge 8 marzo 2017, n°24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie", anche conosciuta come Legge Gelli Bianco?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie [...], si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida [...]</li> <li>B. [...] in mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico assistenziali</li> <li>C. Tutte le risposte precedenti appartengono all'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n°24 Gelli-Bianco</li> <li>D. Nessuna delle risposte precedenti appartengono all'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n°24 Gelli-Bianco</li> </ul>	C
16	<p>Secondo l'articolo 7 del Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati (Regolamento (UE) 2016/679) tra le condizioni per il consenso figurano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. [...]</li> <li>B. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di prestare il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.</li> <li>C. Le risposte A e B sono entrambe corrette</li> <li>D. Nessuna delle precedenti</li> </ul>	C

	Quesito	Riportare risposta corretta
17	<p>L'art. 3 del Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche 2019 relativamente al "RISPETTO E ALLA NON DISCRIMINAZIONE" precisa quanto segue?</p> <p>A. L'Infermiere cura e si prende cura della persona assistita, nel rispetto della dignità, della libertà, dell'eguaglianza, delle sue scelte di vita e concezione di salute e benessere, senza alcuna distinzione sociale, di genere, di orientamento della sessualità, etnica, religiosa e culturale</p> <p>B. L'Infermiere si astiene da ogni forma di discriminazione e colpevolizzazione nei confronti di tutti coloro che incontra nel suo operare</p> <p>C. L'Infermiere si affida al metodo del buon padre di famiglia</p> <p>D. Le affermazioni al punto A e B sono entrambe corrette</p>	D
18	<p>Alla dimissione dell'assistito dall'Unità Operativa (UO) di degenza, la documentazione clinico-assistenziale:</p> <p>A. Deve essere conservata nell'UO di riferimento per almeno un anno e successivamente archiviata</p> <p>B. Deve essere consegnata all'assistito, o al suo caregiver, in quanto riconosciuto come possessore legittimo dei dati sensibili in essa contenuti</p> <p>C. Deve essere conservata illimitatamente in appositi archivi autonomi all'interno dell'azienda</p> <p>D. Non deve essere conservata</p>	C
19	<p>Fra i principi basilari della norma n. 219 del 22 dicembre 2017 "Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento", vi è:</p> <p>A. La tutela contro gli atti di violenza</p> <p>B. La tutela del diritto alla autodeterminazione</p> <p>C. La tutela del diritto alla privacy</p> <p>D. La tutela dei beni personali della persona in Ospedale</p>	B
20	<p>Quando va eseguita l'antisepsi cutanea e la tricotomia preoperatoria?</p> <p>A. Eseguire l'antisepsi cutanea almeno la sera prima dell'intervento e la tricotomia immediatamente prima dell'intervento</p> <p>B. Eseguire l'antisepsi cutanea e la tricotomia al domicilio almeno 24 ore prima dell'ingresso in ospedale</p> <p>C. Non è raccomandato procedere all'antisepsi cutanea pre chirurgica</p> <p>D. Nessuna delle precedenti</p>	A

21	<p><b>Indicare 3 interventi assistenziali da garantire al paziente durante la fase di acme febbrile e indicare 3 interventi assistenziali da garantire al paziente durante la fase e di defervescenza della febbre.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rimuovere le coperte o i vestiti in eccesso per favorire la dispersione del calore</li> <li>2. Raffreddare la temperatura ambientale e aumentare la circolazione dell'aria</li> <li>3. Favorire il raffreddamento del paziente attraverso l'evaporazione e la conduzione se la temperatura è &gt;39.5°C</li> <li>4. Valutare il PV (soprattutto il modello respiratorio in pazienti con patologie cardiorespiratorie e la necessità di O<sub>2</sub> terapia)</li> <li>5. Somministrare e/o stimolare il paziente ad aumentare l'introito di liquidi</li> <li>6. Garantire e/o educare un'igiene orale frequente</li> <li>7. Ridurre gli stimoli ambientali e favorire il riposo</li> <li>8. Se indicata, concordare con il medico la somministrazione di farmaci antipiretici</li> <li>9. Emocoltura</li> </ol> <p>fase di defervescenza della febbre:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cambiare frequentemente gli abiti e le lenzuola del paziente</li> <li>2. Monitorare l'eventuale presenza di segni e sintomi di disidratazione</li> <li>3. Valutare con il medico la somministrazione di antibiotici per via orale o parenterale</li> <li>4. Stimolare il paziente ad assumere alimenti ricchi di carboidrati e proteine</li> </ol> <p><i>PUNTI 1 PER OGNI AFFERMAZIONE CORRETTA</i></p>
22	<p><b>Indicare 6 principali manifestazioni cliniche del paziente con embolia polmonare</b></p> <p>Tosse secca improvvisa  Dispnea  tachipnea  Dolore Toracico pleurico o anginoso  Tachicardia e Febbre sono comuni  Emottisi grave  Edema arti inferiori, caldi e dolenti  Cianosi  Sincope  Sfregamento pleurico  Sibili diffusi, rantoli  Turgore giugulari  Senso di morte imminente</p> <p><i>PUNTI 1 PER OGNI AFFERMAZIONE CORRETTA</i></p>
23	<p><b>Indicare 4 vantaggi che offre lo strofinamento alcolico rispetto al lavaggio mani</b></p> <p>-sempre disponibile ed a portata di mano  -velocità nell'esecuzione  -aumentata efficacia  -protezione della cute/presenza sostanze emollienti  -minor rischio di ICA</p> <p><i>PUNTI 2 PER OGNI AFFERMAZIONE CORRETTA</i></p>

24	<p><b>Tradurre o restituire il significato della seguente frase</b></p> <p>Albert Beal wants a change of his career. He desires to become a midwife. For this reason he needs to attend the University and training for three years at least.</p> <p>Albert Beal vuole un cambiamento della sua carriera. Lui desidera diventare un' ostetrica. Per questa ragione ha bisogno di frequentare l'università e di fare tirocinio per minimo tre anni.</p>
25	<p><b>Per quale motivo è di prassi salvare un documento in formato PDF?</b></p> <p>Il PDF, ovvero Portable Document Format (formato di documento portatile), è utilizzato per mostrare documenti in un formato elettronico indipendente dal tipo di software, hardware o sistema operativo con cui viene visualizzato.</p>







114

# CORRETTORE PROVA SCRITTA D

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI

PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 10 POSTI

DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CATEGORIA D

	Quesito	Riportare risposta corretta
1	<p>Il catetere di Swan Ganz permette:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. La misurazione della pressione venosa</li> <li>B. La misurazione della pressione in arteria polmonare</li> <li>C. L'infusione di liquidi e farmaci</li> <li>D. Tutte le precedenti</li> </ul>	D
2	<p>Un infermiere deve posizionare un catetere vescicale con tecnica sterile. Quale accorgimento deve adottare per non contaminare il campo sterile?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Aprire il telo sterile tenendolo lontano dal corpo</li> <li>B. Durante il collocamento sul campo sterile tenere il materiale distante circa 30 centimetri dal piano di lavoro</li> <li>C. Valutare l'integrità, l'indicatore di sterilità e la presenza di eventuale umidità delle confezioni sterili</li> <li>D. Tutte le precedenti</li> </ul>	D
3	<p>In presenza di accertata disfagia ai soli liquidi è indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Assumere liquidi solo per via endovenosa</li> <li>B. Assumere per via orale liquidi addensati o acqua gelificata</li> <li>C. Assumere tanta frutta come sola fonte di idratazione</li> <li>D. Sospendere qualsiasi tipo di alimentazione per via orale</li> </ul>	B
4	<p>Individui quali tra i presidi in elenco non sono riconosciuti come mezzi per la contenzione fisica della persona assistita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Bendaggio chirurgico compressivo</li> <li>B. Spondine e ferma-caviglie</li> <li>C. Ferma-polsi e cintura pelvica</li> <li>D. Cintura addominale e ferma-polsi</li> </ul>	A
5	<p>Cos'è una pandemia?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. La comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un certo territorio in un breve periodo di tempo</li> <li>B. Una malattia che, diffondendosi rapidamente tra le persone, si espande in vaste aree geografiche su scala planetaria</li> <li>C. La presenza costante di un numero limitato di casi di una malattia in un certo territorio</li> <li>D. Nessuna delle precedenti</li> </ul>	B
6	<p>E' possibile somministrare una sacca di emocomponenti gruppo AB Rh negativo ad un paziente di gruppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Gruppo 0 Rh positivo</li> <li>B. Gruppo A Rh positivo</li> <li>C. Gruppo AB Rh positivo</li> <li>D. Gruppo B Rh negativo</li> </ul>	C

	Quesito	Riportare risposta corretta
7	<p>Se si vuole somministrare 50 milligrammi di una soluzione all'1%, quanti millilitri della stessa soluzione è necessario utilizzare?</p> <p>A. 10 millilitri            B. 0,5 millilitri            C. 5 millilitri            D. 50 millilitri</p>	C
8	<p>Secondo il comma 4 dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 739 "Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere", l'infermiere:</p> <p>A. Contribuisce alla formazione del personale di supporto            B. Ha competenza esclusiva in materia di formazione del personale di supporto            C. Non contribuisce alla formazione del personale di supporto in quanto competenza esclusiva del personale di supporto medesimo            D. Nessuna delle precedenti</p>	A
9	<p>Individui gli interventi di educazione sanitaria da prevedere nel piano di dimissione ad un paziente in terapia con anticoagulante orale:</p> <p>A. Istruire la persona assistita circa le modalità e i tempi di assunzione del farmaco            B. Istruire la persona assistita circa i potenziali rischi legati all'assunzione del farmaco            C. Istruire la persona assistita circa le possibili interazioni con altri farmaci e alimenti            D. Tutte le risposte sono corrette</p>	D
10	<p>Identifici quale tra i seguenti outcomes descritti in letteratura corrisponde ad un insieme di esiti correlati all'assistenza (Nursing Sensitive Outcomes – NSO):</p> <p>A. Infezioni del tratto urinario, errori di somministrazione dei farmaci            B. Lesioni da pressione, uso delle contenzioni, dolore, cadute            C. Infezione della ferita chirurgica, soddisfazione e benessere lavorativo, soddisfazione dell'utente, self-care            D. Tutte le precedenti</p>	D
11	<p>Quale delle seguenti scale è una scala di rilevazione del rischio di compromissione dell'integrità cutanea ?</p> <p>A. NRS (Numerical Rating Scale)            B. Braden            C. Glasgow            D. Stratify</p>	B

	Quesito	Riportare risposta corretta
12	<p>Nella corretta gestione del CVC (Catetere Venoso Centrale) la medicazione dell'exit-site :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Semipermeabile sterile va cambiata almeno ogni 5-7 giorni</li> <li>B. Con garza e cerotto sterile va cambiata ogni 2 giorni</li> <li>C. Va sostituita subito in caso di secrezioni o dolorabilità della sede</li> <li>D. Tutte le risposte sono corrette</li> </ul>	D
13	<p>Quale di queste misure contribuisce a contenere la contaminazione vescicale nella persona portatrice di catetere vescicale?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Disconnettere il circuito durante le fasi di trasporto del paziente</li> <li>B. Sostituire il catetere vescicale ogni quindici giorni</li> <li>C. Mantenere la sacca delle urine al di sotto del livello vescicale</li> <li>D. Mantenere la sacca delle urine al di sopra del livello vescicale</li> </ul>	C
14	<p>E' possibile somministrare farmaci attraverso la PEG (Gastrostomia Endoscopica Percutanea) seguendo alcuni accorgimenti, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Somministrare il farmaco senza sospendere la nutrizione per evitare il rischio di precipitazione degli alimenti o dei farmaci</li> <li>B. Somministrare solo formule farmaceutiche liquide</li> <li>C. Somministrare un farmaco alla volta, irrigando la sonda dopo ogni somministrazione.</li> <li>D. Somministrare le compresse dopo averle frantumate finemente e diluite nella miscela nutritiva</li> </ul>	C
15	<p>Secondo l'articolo 6 <i>"Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria"</i> della Legge 8 marzo 2017, n. 24 <i>"Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie"</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida [...]</li> <li>B. Qualora l'evento si sia verificato a causa di negligenza, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida [...]</li> <li>C. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imprudenza, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida [...]</li> <li>D. Nessuna delle precedenti</li> </ul>	A


	Quesito	Riportare risposta corretta
16	<p>Secondo l'articolo 4 del Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati (Regolamento (UE) 2016/679) la definizione di "dati relativi alla salute" è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. I dati personali attinenti alla salute esclusivamente fisica di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute</li> <li>B. I dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute</li> <li>C. I dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, esclusa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute</li> <li>D. Nessuna delle precedenti</li> </ul>	B
17	<p>Sulla "SUPERVISIONE E SICUREZZA" l'art. 11 del Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche 2019 precisa quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. L'ambito della Sicurezza non è trattato dal Codice Deontologico</li> <li>B. L'Infermiere si forma e chiede supervisione, laddove vi siano attività nuove o sulle quali si abbia limitata casistica e comunque ogni qualvolta ne ravvisi la necessità</li> <li>C. L'Infermiere si forma e chiede supervisione esclusivamente laddove vi siano attività pericolose per gli assistiti o sulle quali si abbia limitata casistica</li> <li>D. L'Infermiere chiede supervisione solo se ne ravvisa la necessità e attraverso il supporto di un medico</li> </ul>	B
18	<p>I requisiti cui deve conformarsi la documentazione clinica (sia essa analogica o elettronica) sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Accuratezza, essenzialità, veridicità</li> <li>B. Chiarezza, pertinenza, tempestività</li> <li>C. Completezza e tracciabilità</li> <li>D. Tutte le precedenti</li> </ul>	D
19	<p>Secondo la norma n. 219 del 22 dicembre 2017 "Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento", il consenso informato acquisito durante la degenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Deve essere consegnato in originale al paziente</li> <li>B. Deve essere inserito in documentazione clinica di ricovero e nel fascicolo elettronico</li> <li>C. Deve essere consegnato alla famiglia in caso di persona ricoverata non competente</li> <li>D. Deve essere eliminato dopo l'espletamento della procedura/intervento</li> </ul>	B

20	<p>Cosa si intende per profilassi antibiotica perioperatoria?</p> <p>A. Si intende la somministrazione di antibiotici 30-60 minuti precedenti l'inizio dell'intervento, in assenza di infezione di fatto, allo scopo di prevenirne l'insorgenza e la successiva diffusione. L'uso dell'antibiotico in questo caso non ha finalità terapeutiche, ma solo preventive</p> <p>B. Si intende la somministrazione di antibiotici il giorno prima dell'intervento. L'uso dell'antibiotico in questo caso ha finalità terapeutiche</p> <p>C. Si intende la somministrazione di antibiotici una settimana prima dell'intervento. L'uso dell'antibiotico in questo caso ha finalità terapeutiche</p> <p>D. Si intende la somministrazione di antibiotici una settimana prima dell'intervento. L'uso dell'antibiotico in questo caso non ha finalità terapeutiche</p>	A												
21	<p><b>Indicare 6 caratteristiche del dolore che devono essere valutate nel paziente (eventualmente seguendo anche il sistema PQRST)</b></p> <p><i>PUNTI 1 PER OGNI AFFERMAZIONE CORRETTA</i></p> <table border="1" data-bbox="264 947 1453 1464"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="264 947 1453 994">Sistema PQRST</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="264 994 815 1120"> <b>Provocazione</b>  <i>(Provocation/Palliation)</i> </td> <td data-bbox="815 994 1453 1120"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Da cosa è provocato il dolore</li> <li>• Che cosa lo fa peggiorare?</li> <li>• Che cosa lo fa migliorare?</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="264 1120 815 1205"> <b>Qualità</b>  <i>(Quality/Description)</i> </td> <td data-bbox="815 1120 1453 1205"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Che tipo di dolore è?</li> <li>• A cosa assomiglia?</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="264 1205 815 1290"> <b>Irradiazione/Sede</b>  <i>(Region/Radiation)</i> </td> <td data-bbox="815 1205 1453 1290"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dove è il dolore?</li> <li>• Dove si irradia?</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="264 1290 815 1375"> <b>Severità (Gravità)</b>  <i>(Severity/Scale)</i> </td> <td data-bbox="815 1290 1453 1375"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quanto è forte?</li> <li>• Qual è la misura del dolore?</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="264 1375 815 1464"> <b>Tempo</b>  <i>(Timing/Type of Onset)</i> </td> <td data-bbox="815 1375 1453 1464"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• C'è sempre o va e viene?</li> <li>• Da quanto tempo dura?</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>		Sistema PQRST		<b>Provocazione</b> <i>(Provocation/Palliation)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Da cosa è provocato il dolore</li> <li>• Che cosa lo fa peggiorare?</li> <li>• Che cosa lo fa migliorare?</li> </ul>	<b>Qualità</b> <i>(Quality/Description)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Che tipo di dolore è?</li> <li>• A cosa assomiglia?</li> </ul>	<b>Irradiazione/Sede</b> <i>(Region/Radiation)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dove è il dolore?</li> <li>• Dove si irradia?</li> </ul>	<b>Severità (Gravità)</b> <i>(Severity/Scale)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quanto è forte?</li> <li>• Qual è la misura del dolore?</li> </ul>	<b>Tempo</b> <i>(Timing/Type of Onset)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• C'è sempre o va e viene?</li> <li>• Da quanto tempo dura?</li> </ul>
Sistema PQRST														
<b>Provocazione</b> <i>(Provocation/Palliation)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Da cosa è provocato il dolore</li> <li>• Che cosa lo fa peggiorare?</li> <li>• Che cosa lo fa migliorare?</li> </ul>													
<b>Qualità</b> <i>(Quality/Description)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Che tipo di dolore è?</li> <li>• A cosa assomiglia?</li> </ul>													
<b>Irradiazione/Sede</b> <i>(Region/Radiation)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dove è il dolore?</li> <li>• Dove si irradia?</li> </ul>													
<b>Severità (Gravità)</b> <i>(Severity/Scale)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quanto è forte?</li> <li>• Qual è la misura del dolore?</li> </ul>													
<b>Tempo</b> <i>(Timing/Type of Onset)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• C'è sempre o va e viene?</li> <li>• Da quanto tempo dura?</li> </ul>													
22	<p><b>Indicare 6 principali manifestazioni cliniche del paziente con ipoglicemia acuta</b></p> <p>Tremori intenzionali  Confusione mentale  Debolezza stanchezza  Tachicardia  Sudorazione, diaforesi  Cute fredda ed umida  Cefalea  Nervosismo irritabilità  Vista offuscata o sdoppiata  Fame,  Vertigini</p> <p><i>PUNTI 1 PER OGNI AFFERMAZIONE CORRETTA</i></p>													

23	<p><b>Elenchi i cinque momenti indicati dall'OMS in cui è prevista l'applicazione dell'igiene delle mani:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prima del contatto con il paziente</li> <li>- Prima di una manovra asettica</li> <li>- Dopo contatto con liquido biologico</li> <li>- Dopo contatto con il paziente</li> <li>- Dopo contatto con ambiente circostante il malato</li> </ul> <p><i>5 affermazioni corrette punti 6</i>  <i>4 affermazioni corrette punti 5</i>  <i>3 affermazioni corrette punti 4</i>  <i>2 affermazioni corrette punti 3</i>  <i>1 affermazione corretta punti 2</i></p>
24	<p><b>Tradurre o restituire il significato della seguente frase</b></p> <p>The question “ what kind of music do you like?” is very revealing. It is the number one topic of conversation among young adults who are getting to know each other, according to psychologists from the Universities of Cambridge and Texas.</p> <p>La domanda “ Che genere di musica ti piace” dice molto di sè (è molto eloquente). E' l'argomento al primo posto durante la conversazione tra giovani adulti che si stanno conoscendo, secondo gli psicologi delle Università di Cambridge e Texas</p>
25	<p><b>Quali sono i programmi del pacchetto office?</b></p> <p>Word,  Excell  PowerPoint,  OneNote,  OneDrive for Business,  Publisher,  Skype for Business,  Access,  Outlook.</p>







121

# CORRETTORE PROVA SCRITTA E

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI

PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 10 POSTI

DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CATEGORIA D

	Quesito	Riportare risposta corretta
1	<p>Uno dei ritmi cardiaci in cui è indicata la defibrillazione è:</p> <p>A. L'asistolia  B. Il blocco atrio-ventricolare di primo grado (BAV 1°)  C. La tachicardia ventricolare senza polso  D. Il ritmo sinusale</p>	C
2	<p>Affinché lo strofinamento alcoolico sia efficace è necessario:</p> <p>A. Utilizzare una quantità di prodotto tale che, durante lo strofinamento, non si asciughi prima dei 10-20 secondi  B. Utilizzare almeno 5 ml di soluzione alcoolica  C. Asciugare le mani con carta assorbente dopo aver eseguito lo strofinamento alcoolico  D. Precedere lo strofinamento alcoolico da lavaggio con acqua e sapone</p>	A
3	<p>Quale tra i seguenti alimenti è da eliminare in un paziente a rischio di disfagia:</p> <p>A. Purea  B. Omogeneizzato  C. Minestrina con pasta di piccolo formato  D. Budino</p>	C
4	<p>Individui quali tra i presidi in elenco non sono riconosciuti come mezzi per la contenzione fisica della persona assistita:</p> <p>A. Bendaggio chirurgico compressivo  B. Spondine e ferma-caviglie  C. Ferma-polsi e cintura pelvica  D. Cintura addominale e ferma-polsi</p>	A
5	<p>Cos'è un'epidemia?</p> <p>A La comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un certo territorio in un breve periodo di tempo  B Una malattia che, diffondendosi rapidamente tra le persone, si espande in vaste aree geografiche su scala planetaria  C La presenza costante di un numero limitato di casi di una malattia in un certo territorio  D Nessuna delle precedenti</p>	A
6	<p>E' possibile somministrare una sacca di emocomponenti gruppo A Rh negativo ad un paziente di gruppo:</p> <p>A. Gruppo 0 Rh positivo  B. Gruppo A Rh positivo  C. Gruppo 0 Rh negativo  D. Gruppo B Rh negativo</p>	B

	Quesito	Riportare risposta corretta
7	<p>Quanti milligrammi di principio attivo si trovano in 1 millilitro di Ropivacaina allo 0,2%?</p> <p>A. 0,2 milligrammi            B. 20 milligrammi            C. 200 milligrammi            D. 2 milligrammi</p>	D
8	<p>Quale riferimento normativo definisce il "Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere"?</p> <p>A. Decreto del ministero della sanità 14 settembre 1994, N° 739            B. Decreto del ministero dell'istruzione 14 settembre 1996, N° 739            C. Legge 26 febbraio 1999, n. 42            D. Decreto del ministero della sanità 14 settembre 1994, n° 740</p>	A
9	<p>Quale colore differenzia l'ogiva dei contenitori mobili, comunemente detti "bombole" di Gas Medicinali, contenente ossigeno?</p> <p>A. Verde            B. Grigio            C. Blu            D. Bianco</p>	D
10	<p>Identifichi quale tra i seguenti outcomes descritti in letteratura corrisponde ad un insieme di esiti correlati all'assistenza (Nursing Sensitive Outcomes – NSO):</p> <p>A. Infezioni del tratto urinario, errori di somministrazione dei farmaci            B. Lesioni da pressione, uso delle contenzioni, dolore, cadute            C. Infezione della ferita chirurgica, soddisfazione e benessere lavorativo, soddisfazione dell'utente, self-care            D. Tutte le precedenti</p>	D
11	<p>Quale delle seguenti scale è una scala di rilevazione del rischio di compromissione dell'integrità cutanea ?</p> <p>A. NRS (Numerical Rating Scale)            B. Braden            C. Glasgow            D. Stratify</p>	B

	Quesito	Riportare risposta corretta
12	<p>Nella corretta gestione del CVC (Catetere Venoso Centrale) la medicazione dell'exit-site :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Semipermeabile sterile va cambiata almeno ogni 5-7 giorni</li> <li>B. Con garza e cerotto sterile va cambiata ogni 2 giorni</li> <li>C. Va sostituita subito in caso di secrezioni o dolorabilità della sede</li> <li>D. Tutte le risposte sono corrette</li> </ul>	D
13	<p>Quale di queste misure contribuisce a contenere la contaminazione vescicale nella persona portatrice di catetere vescicale?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Disconnettere il circuito durante le fasi di trasporto del paziente</li> <li>B. Sostituire il catetere vescicale ogni quindici giorni</li> <li>C. Mantenere la sacca delle urine al di sotto del livello vescicale</li> <li>D. Mantenere la sacca delle urine al di sopra del livello vescicale</li> </ul>	C
14	<p>E' possibile somministrare farmaci attraverso la PEG (Gastrostomia Endoscopica Percutanea) seguendo alcuni accorgimenti, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Somministrare il farmaco senza sospendere la nutrizione per evitare il rischio di precipitazione degli alimenti o dei farmaci</li> <li>B. Somministrare solo formule farmaceutiche liquide</li> <li>C. Somministrare un farmaco alla volta, irrigando la sonda dopo ogni somministrazione.</li> <li>D. Somministrare le compresse dopo averle frantumate finemente e diluite nella miscela nutritiva</li> </ul>	C
15	<p>Secondo l'articolo 6 <i>"Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria"</i> della Legge 8 marzo 2017, n. 24 <i>"Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie"</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida [...]</li> <li>B. Qualora l'evento si sia verificato a causa di negligenza, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida [...]</li> <li>C. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imprudenza, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida [...]</li> <li>D. Nessuna delle precedenti</li> </ul>	A


	Quesito	Riportare risposta corretta
16	<p>Secondo l'articolo 4 del Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati (Regolamento (UE) 2016/679) la definizione di "dati relativi alla salute" è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. I dati personali attinenti alla salute esclusivamente fisica di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute</li> <li>B. I dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute</li> <li>C. I dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, esclusa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute</li> <li>D. Nessuna delle precedenti</li> </ul>	B
17	<p>Sulla "SUPERVISIONE E SICUREZZA" l'art. 11 del Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche 2019 precisa quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. L'ambito della Sicurezza non è trattato dal Codice Deontologico</li> <li>B. L'Infermiere si forma e chiede supervisione, laddove vi siano attività nuove o sulle quali si abbia limitata casistica e comunque ogni qualvolta ne ravvisi la necessità</li> <li>C. L'Infermiere si forma e chiede supervisione esclusivamente laddove vi siano attività pericolose per gli assistiti o sulle quali si abbia limitata casistica</li> <li>D. L'Infermiere chiede supervisione solo se ne ravvisa la necessità e attraverso il supporto di un medico</li> </ul>	B
18	<p>I requisiti cui deve conformarsi la documentazione clinica (sia essa analogica o elettronica) sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Accuratezza, essenzialità, veridicità</li> <li>B. Chiarezza, pertinenza, tempestività</li> <li>C. Completezza e tracciabilità</li> <li>D. Tutte le precedenti</li> </ul>	D
19	<p>Secondo la norma n. 219 del 22 dicembre 2017 "Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento", il consenso informato acquisito durante la degenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Deve essere consegnato in originale al paziente</li> <li>B. Deve essere inserito in documentazione clinica di ricovero e nel fascicolo elettronico</li> <li>C. Deve essere consegnato alla famiglia in caso di persona ricoverata non competente</li> <li>D. Deve esser eliminato dopo l'espletamento della procedura/intervento</li> </ul>	B

	Quesito	Riportare risposta corretta
20	<p>Cosa si intende per profilassi antibiotica perioperatoria?</p> <p>A. Si intende la somministrazione di antibiotici 30-60 minuti precedenti l'inizio dell'intervento, in assenza di infezione di fatto, allo scopo di prevenirne l'insorgenza e la successiva diffusione. L'uso dell'antibiotico in questo caso non ha finalità terapeutiche, ma solo preventive</p> <p>B. Si intende la somministrazione di antibiotici il giorno prima dell'intervento. L'uso dell'antibiotico in questo caso ha finalità terapeutiche</p> <p>C. Si intende la somministrazione di antibiotici una settimana prima dell'intervento. L'uso dell'antibiotico in questo caso ha finalità terapeutiche</p> <p>D. Si intende la somministrazione di antibiotici una settimana prima dell'intervento. L'uso dell'antibiotico in questo caso non ha finalità terapeutiche</p>	A
21	<p><b>Indicare 6 principali effetti collaterali che dovremmo considerare in un paziente in terapia con oppioidi per il trattamento del dolore acuto/cronico?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nausea</li> <li>- Vomito e sudorazione (da stimolazione dei chemorecettori della zona Trigger)</li> <li>- Astenia, mancanza di appetito</li> <li>- Stipsi (dovuta al rallentamento della peristalsi e al conseguente riassorbimento di acqua)</li> <li>- Sedazione (può manifestarsi in modo frequente all'inizio del trattamento o quando la dose degli oppioidi viene aumentata in modo significativo o brusco)</li> <li>- Confusione/disorientamento (è consigliato ricercare le cause della confusione, considerando comunque che è molto probabile che la terapia appena iniziata abbia un ruolo primario)/allucinazioni</li> <li>- Ipotensione arteriosa (se a dosaggi elevati)</li> <li>- Depressione respiratoria (se a dosaggi elevati)/bradipnea</li> <li>- Dipendenza, assuefazione, astinenza</li> <li>- Prurito</li> <li>- Miosi</li> <li>- Secchezza delle fauci</li> <li>- Alterazione sfera sessuale</li> <li>- Eruzione cutanea</li> </ul> <p><i>PUNTI 1 PER OGNI AFFERMAZIONE CORRETTA</i></p>	
22	<p><b>Indicare 6 principali manifestazioni cliniche del paziente con ipertensione arteriosa</b></p> <p>Mal di testa, Vertigini, Visione offuscata e alterazioni della retina (ad es. emorragie, essudati, restringimento arteriolare) Cefalea, nausea, vomito, convulsioni, retinopatia, disturbi visivi, visione offuscata, dolore toracico, mancanza di respiro, deficit neurologici focali, stupore, coma, edema polmonare,</p>	

	<p>emorragia, epistassi, trombosi, embolia , insufficienza renale acuta e/o dolore addominale, cardiopalmo, tachicardia, iperemia e rossore cutaneo, senso di ottundimento, eventi acuti ( infarto miocardico, ictus cerebrale, scompenso cardiaco), agitazione e irritabilità, acufene</p> <p><i>PUNTI 1 PER OGNI AFFERMAZIONE CORRETTA</i></p>
23	<p><b>Elenchi i cinque momenti indicati dall'OMS in cui è prevista l'applicazione dell'igiene delle mani:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prima del contatto con il paziente</li> <li>- Prima di una manovra asettica</li> <li>- Dopo contatto con liquido biologico</li> <li>- Dopo contatto con il paziente</li> <li>- Dopo contatto con ambiente circostante il malato</li> </ul> <p><i>5 affermazioni corrette punti 6</i>  <i>4 affermazioni corrette punti 5</i>  <i>3 affermazioni corrette punti 4</i>  <i>2 affermazioni corrette punti 3</i>  <i>1 affermazione corretta punti 2</i></p>
24	<p><b>Tradurre o restituire il significato della seguente frase</b></p> <p>Things that really annoy us:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dentists who try to chat to you when your mouth is full of equipment</li> <li>b. When you want to buy something in a shop and you have to wait for the shop assistant to finish a telephone conversation with a friend</li> <li>c. When you get a taxi and the driver asks you the best way to go</li> </ol> <p>Cose che ci infastidiscono davvero:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. I Dentisti che cercano di chiacchierare con te quando la tua bocca è piena di attrezzatura</li> <li>b. Quando vuoi comprare qualcosa in un negozio e devi attendere che la commessa finisca la conversazione telefonica con un suo amico</li> <li>c. Quando prendi un taxi e l'autista ti chiede la strada migliore</li> </ol>
25	<p><b>Che cosa è un browser? Quali browser conosce?</b></p> <p>Nel linguaggio informatico, programma di un computer che permette il collegamento alla rete Internet e mediante il quale si può navigare da un sito telematico all'altro.</p>







128

# CORRETTORE PROVA SCRITTA F

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI

PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 10 POSTI

DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CATEGORIA D

	Quesito	Riportare risposta corretta
1	<p>Il respiro di Cheyne-Stokes può essere presente nei traumi del sistema nervoso centrale ed è caratterizzato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Respiro irregolare, gradualmente più veloce e profondo, poi lento e superficiale, per arrivare a periodi di apnea fino anche a 60 secondi</li> <li>B. Respiro irregolare, superficiale</li> <li>C. Respiro irregolare, lento, profondo, a bocca aperta</li> <li>D. Respiro regolare superficiale molto rapido</li> </ul>	A
2	<p>Un infermiere sta effettuando un esame colturale su una ferita. Quale sequenza di azioni è la più appropriata?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Rimuovere la medicazione sporca, disinfettare la ferita, inserire il tampone nel terreno di coltura e applicare una medicazione pulita</li> <li>B. Rimuovere la medicazione sporca, inserire il tampone colturale nella ferita, inserire il tampone nel terreno di coltura, confezionare il campione per il trasporto, detergere, disinfettare la ferita e applicare una medicazione pulita</li> <li>C. Rimuovere la medicazione sporca, inserire il tampone colturale nella ferita, inserire il tampone nel terreno di coltura, confezionare il campione per il trasporto, disinfettare la ferita e applicare una medicazione pulita</li> <li>D. Nessuna delle precedenti</li> </ul>	B
3	<p>Come si calcola il BMI (Body mass index o IMC Indice di Massa Corporea):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. <math>\text{Peso} \div \text{Altezza}</math></li> <li>B. <math>\text{Peso} + \text{Altezza}</math></li> <li>C. <math>\text{Peso} - \text{Altezza}</math></li> <li>D. <math>\text{Peso} \div \text{Altezza al quadrato}</math></li> </ul>	D
4	<p>Individui quali tra i presidi in elenco non sono riconosciuti come mezzi per la contenzione fisica della persona assistita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Bendaggio chirurgico compressivo</li> <li>B. Spondine e ferma-caviglie</li> <li>C. Ferma-polsi e cintura pelvica</li> <li>D. Cintura addominale e ferma-polsi</li> </ul>	A
5	<p>Cos'è un'endemia?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. La comparsa di un numero elevato di casi di una malattia in un certo territorio in un breve periodo di tempo</li> <li>B. Una malattia che, diffondendosi rapidamente tra le persone, si espande in vaste aree geografiche su scala planetaria</li> <li>C. Costante permanenza, in un determinato territorio, di una malattia che tende a presentarsi sporadicamente o a piccoli focolai e con una incidenza relativamente uniforme,</li> <li>D. Nessuna delle precedenti</li> </ul>	C

	Quesito	Riportare risposta corretta
6	<p>E' possibile somministrare una sacca di emocomponenti gruppo B Rh negativo ad un paziente di gruppo:</p> <p>A. Gruppo 0 Rh positivo            B. Gruppo A Rh positivo            C. Gruppo 0 Rh negativo            D. Gruppo B Rh positivo</p>	D
7	<p>Dovendo somministrare 400 milligrammi di antibiotico in soluzione orale ad una concentrazione di 250 milligrammi in 25 millilitri, quanti millilitri di soluzione deve assumere il paziente?</p> <p>A. 0,4 millilitri            B. 4 millilitri            C. 12 millilitri            D. 40 millilitri</p>	D
8	<p>Quali sono le aree di formazione infermieristica post base inerenti alla pratica specialistica identificate all'art. 1 comma 5 del Decreto Ministeriale del 14 settembre 1994 n° 739 "Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere"?</p> <p>A. Management per le professioni sanitarie ed area critica            B. Management per le professioni sanitarie, area critica ed area pediatrica            C. Sanità pubblica, pediatria, salute mentale-psichiatria, geriatria, area critica            D. Area territoriale, infermieristica di comunità</p>	C
9	<p>Quale farmaco viene utilizzato per neutralizzare l'azione dell'eparina in caso di sovradosaggio?</p> <p>A. Glucagone            B. Pralidossima            C. Solfato di Protamina            D. Naloxone</p>	C
10	<p>Identifici quale tra i seguenti outcomes descritti in letteratura corrisponde ad un insieme di esiti correlati all'assistenza (Nursing Sensitive Outcomes – NSO):</p> <p>A. Infezioni del tratto urinario, errori di somministrazione dei farmaci            B. Lesioni da pressione, uso delle contenzioni, dolore, cadute            C. Infezione della ferita chirurgica, soddisfazione e benessere lavorativo, soddisfazione dell'utente, self-care            D. Tutte le precedenti</p>	D
11	<p>Quale delle seguenti scale è una scala di rilevazione del rischio di compromissione dell'integrità cutanea ?</p> <p>A. NRS (Numerical Rating Scale)            B. Braden            C. Glasgow            D. Stratify</p>	B

	Quesito	Riportare risposta corretta
12	<p>Nella corretta gestione del CVC (Catetere Venoso Centrale) la medicazione dell'exit-site :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Semipermeabile sterile va cambiata almeno ogni 5-7 giorni</li> <li>B. Con garza e cerotto sterile va cambiata ogni 2 giorni</li> <li>C. Va sostituita subito in caso di secrezioni o dolorabilità della sede</li> <li>D. Tutte le risposte sono corrette</li> </ul>	D
13	<p>Quale di queste misure contribuisce a contenere la contaminazione vescicale nella persona portatrice di catetere vescicale?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Disconnettere il circuito durante le fasi di trasporto del paziente</li> <li>B. Sostituire il catetere vescicale ogni quindici giorni</li> <li>C. Mantenere la sacca delle urine al di sotto del livello vescicale</li> <li>D. Mantenere la sacca delle urine al di sopra del livello vescicale</li> </ul>	C
14	<p>E' possibile somministrare farmaci attraverso la PEG (Gastrostomia Endoscopica Percutanea) seguendo alcuni accorgimenti, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Somministrare il farmaco senza sospendere la nutrizione per evitare il rischio di precipitazione degli alimenti o dei farmaci</li> <li>B. Somministrare solo formule farmaceutiche liquide</li> <li>C. Somministrare un farmaco alla volta, irrigando la sonda dopo ogni somministrazione.</li> <li>D. Somministrare le compresse dopo averle frantumate finemente e diluite nella miscela nutritiva</li> </ul>	C
15	<p>Secondo l'articolo 6 <i>"Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria"</i> della Legge 8 marzo 2017, n. 24 <i>"Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie"</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida [...]</li> <li>B. Qualora l'evento si sia verificato a causa di negligenza, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida [...]</li> <li>C. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imprudenza, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida [...]</li> <li>D. Nessuna delle precedenti</li> </ul>	A

	Quesito	Riportare risposta corretta
16	<p>Secondo l'articolo 4 del Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati (Regolamento (UE) 2016/679) la definizione di "dati relativi alla salute" è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. I dati personali attinenti alla salute esclusivamente fisica di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute</li> <li>B. I dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute</li> <li>C. I dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, esclusa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute</li> <li>D. Nessuna delle precedenti</li> </ul>	B
17	<p>Sulla "SUPERVISIONE E SICUREZZA" l'art. 11 del Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche 2019 precisa quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. L'ambito della Sicurezza non è trattato dal Codice Deontologico</li> <li>B. L'Infermiere si forma e chiede supervisione, laddove vi siano attività nuove o sulle quali si abbia limitata casistica e comunque ogni qualvolta ne ravvisi la necessità</li> <li>C. L'Infermiere si forma e chiede supervisione esclusivamente laddove vi siano attività pericolose per gli assistiti o sulle quali si abbia limitata casistica</li> <li>D. L'Infermiere chiede supervisione solo se ne ravvisa la necessità e attraverso il supporto di un medico</li> </ul>	B
18	<p>I requisiti cui deve conformarsi la documentazione clinica (sia essa analogica o elettronica) sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Accuratezza, essenzialità, veridicità</li> <li>B. Chiarezza, pertinenza, tempestività</li> <li>C. Completezza e tracciabilità</li> <li>D. Tutte le precedenti</li> </ul>	D
19	<p>Secondo la norma n. 219 del 22 dicembre 2017 "Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento", il consenso informato acquisito durante la degenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Deve essere consegnato in originale al paziente</li> <li>B. Deve essere inserito in documentazione clinica di ricovero e nel fascicolo elettronico</li> <li>C. Deve essere consegnato alla famiglia in caso di persona ricoverata non competente</li> <li>D. Deve esser eliminato dopo l'espletamento della procedura/intervento</li> </ul>	B

20	<p>Cosa si intende per profilassi antibiotica perioperatoria?</p> <p>A. Si intende la somministrazione di antibiotici 30-60 minuti precedenti l'inizio dell'intervento, in assenza di infezione di fatto, allo scopo di prevenirne l'insorgenza e la successiva diffusione. L'uso dell'antibiotico in questo caso non ha finalità terapeutiche, ma solo preventive</p> <p>B. Si intende la somministrazione di antibiotici il giorno prima dell'intervento. L'uso dell'antibiotico in questo caso ha finalità terapeutiche</p> <p>C. Si intende la somministrazione di antibiotici una settimana prima dell'intervento. L'uso dell'antibiotico in questo caso ha finalità terapeutiche</p> <p>D. Si intende la somministrazione di antibiotici una settimana prima dell'intervento. L'uso dell'antibiotico in questo caso non ha finalità terapeutiche</p>	A
21	<p><b>Indicare 4 complicanze da considerare in un paziente in nutrizione enterale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Distensione e dolori addominali a causa di una eccessiva velocità o ad elevati volumi di infusione</li> <li>– Diarrea per intolleranza alla soluzione enterale, infezioni batteriche o virali, contaminazioni del preparato nutrizionale o del set di infusione, iperosmolarità della miscela nutrizionale</li> <li>– Aspirazione e polmonite ab ingestis</li> <li>– Polmonite per colonizzazione batterica per scarsa igiene del cavo orale e per l'aspirazione di secrezioni orofaringee contaminate oltre al rigurgito e aspirazione di contenuto gastrico contaminato</li> <li>– Decubito a livello della narice conseguente alla presenza della sonda</li> </ul> <p><i>PUNTI 1,5 PER OGNI AFFERMAZIONE CORRETTA</i></p>	
22	<p><b>Indicare 6 principali manifestazioni cliniche del paziente con cirrosi epatica</b></p> <p>prurito  astenia  ascite  edema arti inferiori  nausea  vomito  stipsi o diarrea o steatorrea  anoressia  calo ponderale  dolore nel quadrante superiore destro dell'addome  emorragie gravi (ematemesi da varici esofagee; melena)  ginecomastia  perdita peli ascellari e toracici  atrofia testicolare  irregolarità del ciclo mestruale  dita a bacchetta di tamburo  contrattura di Dupuytren a livello delle mani  porpora e osteomalacia  alterazioni psichiche  Asterixis</p>	

	<p>foetor hepaticus          Angiomi stellari          Eritema palmare          xantomi palmari, plantari e dei gomiti (xantomi sono accumuli di grasso sotto la superficie della pelle)          epatomegalia</p> <p><i>PUNTI 1 PER OGNI AFFERMAZIONE CORRETTA</i></p>
23	<p><b>Elenchi i cinque momenti indicati dall'OMS in cui è prevista l'applicazione dell'igiene delle mani:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prima del contatto con il paziente</li> <li>- Prima di una manovra asettica</li> <li>- Dopo contatto con liquido biologico</li> <li>- Dopo contatto con il paziente</li> <li>- Dopo contatto con ambiente circostante il malato</li> </ul> <p><i>5 affermazioni corrette punti 6          4 affermazioni corrette punti 5          3 affermazioni corrette punti 4          2 affermazioni corrette punti 3          1 affermazione corretta punti 2</i></p>
24	<p><b>Tradurre o restituire il significato della seguente frase</b></p> <p>Luke is every nutritionist's nightmare: a fifteen -year-old who never eats anything except bread and jam, unbelievably, he is perfectly healthy. He never been seriously ill apart from typical childhood illness</p> <p>Luke è l'incubo di ogni nutrizionista: un quindicenne che non mangia nulla eccetto pane e prosciutto. Incredibilmente è perfettamente in salute. Non è mai stato davvero ammalato a parte per le tipiche malattie dell'infanzia</p>
25	<p><b>Cosa è una rete internet? Cosa è una rete intranet?</b></p> <p>Internet è un sistema pubblico e mondiale che collega le reti di computer mentre la rete intranet è una rete privata accessibile solo da persone autorizzate.</p>







135

# CORRETTORE PROVA SCRITTA G

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI

PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 10 POSTI

DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CATEGORIA D

	Quesito	Riportare risposta corretta
1	La sonda nasogastrica di Sengstaken-Blakemore: <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Ha due palloncini di gonfiaggio indipendenti</li> <li>B. E' efficace nel sanguinamento delle varici esofagee</li> <li>C. Viene introdotta attraverso una narice</li> <li>D. Tutte le precedenti</li> </ul>	D
2	Nell'esecuzione di una emocoltura quale tra queste azioni non è corretta: <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Eseguire la raccolta sempre prima dell'inizio della terapia antibiotica</li> <li>B. Eseguire sempre almeno due campioni da prelievi diversi</li> <li>C. Se il paziente è portatore di devices vascolari centrali, siano essi impiantati oppure no, eseguire un solo prelievo da device</li> <li>D. Per ogni prelievo utilizzare un flacone per anaerobi e successivamente uno per aerobi in questa sequenza</li> </ul>	D
3	In presenza di diabete di tipo 2, è raccomandato: <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Prediligere prodotti integrali</li> <li>B. Eliminare i carboidrati complessi (pasta, pane, patate)</li> <li>C. Eliminare la frutta</li> <li>D. Ridurre l'apporto di grassi e proteine</li> </ul>	A
4	Quali sono gli "ausili" facilitanti la movimentazione delle persone assistite? <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Carrozine</li> <li>B. Materassi anti decubito, ciambelle, sollevatore</li> <li>C. Lenzuolo, cintura ergonomica, barella</li> <li>D. Sollevatori, teli ad alto scorrimento, cintura ergonomica.</li> </ul>	D
5	Definisci la pollachiuria: <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Difficoltà alla minzione</li> <li>B. Insufficienza funzionale dello sfintere uretrale</li> <li>C. Dolore che segue o accompagna la minzione</li> <li>D. Aumento della frequenza della minzione</li> </ul>	D
6	La chiusura della valvola tricuspide durante la sistole impedisce il reflusso di sangue: <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Dal ventricolo destro nell'atrio destro</li> <li>B. Dal sinistro destro nell'atrio sinistro</li> <li>C. Atrio sinistro nell'aorta</li> <li>D. Atrio destro nell'arteria polmonare</li> </ul>	A
7	Un paziente deve assumere per via orale 8 milligrammi di un farmaco in sospensione orale, disponibile in dosaggio di 20 milligrammi in 10 millilitri. Quanti millilitri devono essere somministrati? <ul style="list-style-type: none"> <li>A. 4 millilitri</li> <li>B. 8 millilitri</li> <li>C. 10 millilitri</li> <li>D. 6 millilitri</li> </ul>	A

	Quesito	Riportare risposta corretta
8	<p>Il profilo professionale dell'infermiere, istituito con il Decreto Ministeriale del 14 settembre 1994 n° 739, identifica come attività proprie della professione infermieristica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. L'assistenza generale infermieristica, per la quale al professionista viene riconosciuta piena responsabilità</li> <li>B. L'identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e la formulazione dei relativi obiettivi</li> <li>C. La pianificazione, gestione e valutazione dell'intervento assistenziale infermieristico</li> <li>D. Tutte le precedenti</li> </ul>	D
9	<p>Il paziente sottoposto a chemioterapia antitumorale può manifestare i seguenti effetti collaterali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Disturbi del sonno</li> <li>B. Dolori ossei</li> <li>C. Mucosite</li> <li>D. Ipertensione</li> </ul>	C
10	<p>La contenzione fisica, quale atto di restrizione intenzionale dei movimenti o del comportamento volontario di una persona mediante mezzi fisici, è una procedura che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Deve essere considerata come atto eccezionale, finalizzato al bene della persona ed effettuato nel rispetto della dignità della persona</li> <li>B. Non necessita di prescrizione medica in quanto è sufficiente il giudizio clinico-assistenziale dell'infermiere per procedere all'attivazione</li> <li>C. Deve essere sempre messa in atto per garantire la protezione degli assistiti in stato di agitazione psico-motoria in quanto non esistono strategie che ne consentano la prevenzione</li> <li>D. Tutte le precedenti</li> </ul>	A
11	<p>La rimozione e sostituzione del catetere venoso periferico deve essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Ogni 24 ore</li> <li>B. Su richiesta della persona assistita</li> <li>C. In presenza di medicazione sporca</li> <li>D. In presenza di flogosi locale</li> </ul>	D
12	<p>I criteri che indicano una buona funzionalità della pervietà del CVC (Catetere Venoso Centrale) sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. E' possibile iniettare facilmente</li> <li>B. E' possibile aspirare sangue facilmente</li> <li>C. La persona assistita non segnala alterazioni o sensazioni dolorose durante il lavaggio/infusione</li> <li>D. Tutte le risposte sono corrette</li> </ul>	D

	Quesito	Riportare risposta corretta
13	<p>Quale tra le seguenti indicazioni per la ginnastica vescicale è appropriata in paziente portatore di catetere vescicale?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. La ginnastica vescicale non è raccomandata</li> <li>B. La ginnastica vescicale è raccomandata e va effettuata prima della rimozione del catetere ad intervalli superiori a due ore</li> <li>C. La ginnastica vescicale non è raccomandata se viene effettuata ad intervalli inferiori a due ore</li> <li>D. La ginnastica vescicale va sempre effettuata in quanto riduce il rischio che la persona assistita possa presentare ritenzione urinaria dopo la rimozione del catetere</li> </ul>	A
14	<p>Quale tra le seguenti affermazioni, in merito alla gestione della PEG (Gastrostomia Endoscopica Percutanea), si ritiene sia corretta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Detergere e disinfettare la cute peristomale quotidianamente per la prima settimana dal posizionamento; in seguito sarà sufficiente detergere la zona peristomale con acqua e sapone neutro e mantenere asciutta la zona peristomale per evitare macerazione.</li> <li>B. Medicare "a piatto" con medicazione impermeabile per la prima settimana dal posizionamento</li> <li>C. Mobilizzare la sonda con movimenti di rotazione e di intensa trazione, per prevenire eventuali sue incarcerazioni</li> <li>D. Tenere coperta la PEG con garze sterili per le prime 72 ore dopo la sua applicazione, nei giorni a seguire non è necessario disinfettare la cute e controllare eventuali alterazioni della zona peristomale</li> </ul>	A
15	<p>Secondo la Legge 8 marzo 2017, n. 24 <i>"Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie"</i>, gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. raccomandazioni previste dalle linee guida [...] elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie [...]</li> <li>B. alle buone pratiche clinico-assistenziali in mancanza delle raccomandazioni previste dalle linee guida [...]</li> <li>C. Le risposte A e B sono entrambe corrette</li> <li>D. Nessuna delle precedenti</li> </ul>	C

	Quesito	Riportare risposta corretta
16	<p>Individui gli interventi di educazione sanitaria da prevedere nel piano di dimissione ad un paziente in terapia immunosoppressiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Istruire la persona assistita circa le modalità e i tempi di assunzione del farmaco</li> <li>B. Istruire la persona assistita circa i potenziali rischi legati all'assunzione del farmaco</li> <li>C. Istruire la persona assistita circa le possibili interazioni con altri farmaci e alimenti</li> <li>D. Tutte le risposte sono corrette</li> </ul>	D
17	<p>L'Infermiere è tenuto a rispettare la volontà della persona assistita di NON voler essere informata sul proprio stato di salute (art. 20 del Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche 2019)?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Sì, se l'informazione rifiutata è però necessaria per la salute di soggetti terzi, l'Infermiere si adopera a responsabilizzare l'assistito fornendo le informazioni relative al rischio e alla condotta potenzialmente lesiva</li> <li>B. Sì poiché l'informazione è di competenza medica</li> <li>C. No se ciò costituisce una decisione poco autodeterminata</li> <li>D. Sì sempre</li> </ul>	A
18	<p>Tra i requisiti essenziali per la costruzione delle Linee Guida si riconoscono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. La valutazione rigorosa delle fonti attraverso una revisione sistematica della letteratura</li> <li>B. La multidisciplinarietà del gruppo di lavoro con il coinvolgimento di membri rappresentanti gli assistiti o i caregiver; nonché la programmazione di consultazioni regolari con gli stakeholders</li> <li>C. La chiara esplicitazione dei livelli delle evidenze e della forza delle raccomandazioni</li> <li>D. Tutte le precedenti</li> </ul>	D
19	<p>Nella norma n. 219 del 22 dicembre 2017 "Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento", si specifica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere revocate in qualsiasi momento</li> <li>B. Le disposizioni anticipate di trattamento sono obbligatorie</li> <li>C. Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere registrate esclusivamente in presenza delle forze dell'Ordine</li> <li>D. Le disposizioni anticipate di trattamento perdono di valore se la persona è incosciente</li> </ul>	A

20	<p>Che cosa è lo stomacare?</p> <p>A. Si definisce stomacare l'igiene, l'apparecchiatura della stomia e l'educazione dell'assistito alla gestione della stomia</p> <p>B. Si definisce stomacare la valutazione prechirurgica dell'area in cui apparecchiare la stomia</p> <p>C. Si definisce stomacare il lavaggio del moncone stomale</p> <p>D. Si definisce stomacare la protezione gastrica in caso di terapia con farmaci antiinfiammatori</p>	A
21	<p><b>Indicare 6 i fattori di rischio che possono condurre alla caduta accidentale in ambito assistenziale</b></p> <p><u>Non modificabili</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- età avanzata e/o associata a fragilità</li> <li>- cadute pregresse</li> <li>- comorbilità (es. degenerazione maculare, glaucoma, demenza, etc.)</li> </ul> <p><u>Modificabili</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- instabilità motoria, dell'equilibrio o del cammino, riflessi rallentati</li> <li>- incontinenza</li> <li>- malnutrizione e sarcopenia</li> <li>- vertigini, capogiri</li> <li>- disturbi del sonno</li> <li>- ipotensione posturale</li> <li>-</li> </ul> <p><i>PUNTI 1 PER OGNI AFFERMAZIONE CORRETTA</i></p>	
22	<p><b>Indicare 6 principali manifestazioni cliniche del paziente con edema polmonare</b></p> <p>Tosse secca dispnea da sforzo</p> <p>Dispnea parossistica notturna</p> <p>Ortopnea tachicardia</p> <p>Tachipnea</p> <p>rantoli crepitanti in sede declive</p> <p>escreato schiumoso ed ematico (rosato)</p> <p><i>PUNTI 1 PER OGNI AFFERMAZIONE CORRETTA</i></p>	
23	<p><b>Il lavaggio delle mani può essere sociale, antisettico e chirurgico. Cosa differenzia i vari tipi di lavaggio</b></p> <p>Tempo, prodotto utilizzato, scopo/esito</p> <p>Lavaggio sociale (40-60 secondi); con acqua e sapone o disinfettanti per le mani a base di alcol</p> <p>Lavaggio antisettico (90 secondi circa); con sapone antisettico è indicato nelle aree ad alto rischio prima di qualsiasi procedura invasiva, dopo il contatto con ferite o materiale biologico infetto, prima di assistere pazienti particolarmente suscettibili alle infezioni, dopo aver assistito pazienti infetti.</p> <p>Lavaggio chirurgico (5 minuti circa) delle mani si esegue con sapone antisettico ed è necessario prima di un intervento chirurgico invasivo.</p> <p><i>PUNTI 2 PER OGNI AFFERMAZIONE CORRETTA</i></p>	

24	<p><b>Tradurre o restituire il significato della seguente frase</b></p> <p>I arrived on time! I picked up my suitcase and followed the exit signs. It was great not to have to wait ages for my luggage or to worry about getting a bus to the city center.</p> <p>Sono arrivato puntuale! Ho raccolto la mia valigia e seguito le indicazioni di uscita. E' stato grandioso non dover aspettare anni per il mio bagaglio o preoccuparmi su come trovare un autobus per il centro città.</p>
25	<p><b>Cosa si intende per LOGIN?</b></p> <p>E' la procedura di accesso ad un sistema informatico o ad un'applicazione informatica.</p>







142

# CORRETTORE PROVA SCRITTA H

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI

PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 10 POSTI

DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CATEGORIA D

	Quesito	Riportare risposta corretta
1	<p>Le crisi generalizzate tonico-cloniche durano in genere:</p> <p>A. 10 minuti B. 1-2 minuti C. 30 minuti D. 60 minuti</p>	B
2	<p>Quale tra le seguenti costituisce la principale infezione opportunistica in corso di AIDS?</p> <p>A. Polmonite da Pneumocystis Carinii B. Meningite Batterica C. Endocardite D. Pielonefrite</p>	A
3	<p>I nutrienti energetici sono:</p> <p>A. Proteine, carboidrati, grassi B. Proteine, carboidrati, sali minerali C. Proteine, carboidrati, grassi, vitamine D. Proteine, carboidrati, grassi, sali minerali</p>	A
4	<p>Quali sono gli "ausili" facilitanti la movimentazione delle persone assistite?</p> <p>A. Carrozine B. Materassi anti decubito, ciambelle, sollevatore C. Lenzuolo, cintura ergonomica, barella D. Sollevatori, teli ad alto scorrimento, cintura ergonomica</p>	D
5	<p>Cosa significa disfagia?</p> <p>A. Deglutizione difficoltosa B. Articolazione difficile della parola C. Impossibilità assoluta al passaggio del cibo nell'esofago D. Dolore crampiforme retrosternale</p>	A
6	<p>La chiusura della valvola mitrale o bicuspidale durante la sistole impedisce il reflusso di sangue:</p> <p>A. Dal ventricolo destro nell'atrio destro B. Dal ventricolo sinistro nell'atrio sinistro C. Atrio sinistro nell'aorta D. Atrio destro nell'arteria polmonare</p>	B
7	<p>Ad un paziente sono prescritti 4 milligrammi endovena di un farmaco disponibile in soluzione allo 0,2%. Quanti millilitri di farmaco saranno da somministrare?</p> <p>A. 4 millilitri B. 5,5 millilitri C. 2 millilitri D. 20 millilitri</p>	C

	Quesito	Riportare risposta corretta
8	<p>Il profilo professionale dell'infermiere, istituito con il Decreto Ministeriale del 14 settembre 1994 n° 739, all'art. 1 comma 1 definisce l'infermiere come:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. L'operatore sanitario ausiliario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale infermieristica</li> <li>B. L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, si occupa dell'erogazione dell'assistenza infermieristica anche in assenza dell'iscrizione all'albo professional</li> <li>C. L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale collabora all'erogazione dell'assistenza</li> <li>D. L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica</li> </ul>	D
9	<p>Come deve essere somministrato un farmaco chemioterapico antitumorale?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Contestualmente da 2 operatori</li> <li>B. Indossando DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) idonei</li> <li>C. Esclusivamente a digiuno</li> <li>D. Solo per via parenterale</li> </ul>	B
10	<p>La contenzione fisica, quale atto di restrizione intenzionale dei movimenti o del comportamento volontario di una persona mediante mezzi fisici, è una procedura che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Deve essere considerata come atto eccezionale, finalizzato al bene della persona ed effettuato nel rispetto della dignità della persona</li> <li>B. Non necessita di prescrizione medica in quanto è sufficiente il giudizio clinico-assistenziale dell'infermiere per procedere all'attivazione</li> <li>C. Deve essere sempre messa in atto per garantire la protezione degli assistiti in stato di agitazione psico-motoria in quanto non esistono strategie che ne consentano la prevenzione</li> <li>D. Tutte le precedenti</li> </ul>	A
11	<p>La rimozione e sostituzione del catetere venoso periferico va effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Ogni 24 ore</li> <li>B. Su richiesta della persona assistita</li> <li>C. In presenza di medicazione sporca</li> <li>D. In presenza di flogosi locale</li> </ul>	D
12	<p>I criteri che indicano una buona funzionalità della pervietà del CVC (Catetere Venoso Centrale) sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. E' possibile iniettare facilmente</li> <li>B. E' possibile aspirare sangue facilmente</li> <li>C. La persona assistita non segnala alterazioni o sensazioni dolorose durante il lavaggio/infusione</li> <li>D. Tutte le risposte sono corrette</li> </ul>	D

	Quesito	Riportare risposta corretta
13	<p>Quale tra le seguenti indicazioni per la ginnastica vescicale è appropriata in paziente portatore di catetere vescicale?</p> <p>A. La ginnastica vescicale non è raccomandata</p> <p>B. La ginnastica vescicale è raccomandata e va effettuata prima della rimozione del catetere ad intervalli superiori a due ore</p> <p>C. La ginnastica vescicale non è raccomandata se viene effettuata ad intervalli inferiori a due ore</p> <p>D. La ginnastica vescicale va sempre effettuata in quanto riduce il rischio che la persona assistita possa presentare ritenzione urinaria dopo la rimozione del catetere</p>	A
14	<p>Quale tra le seguenti affermazioni, in merito alla gestione della PEG (Gastrostomia Endoscopica Percutanea), si ritiene sia corretta:</p> <p>A. Detergere e disinfettare la cute peristomale quotidianamente per la prima settimana dal posizionamento; in seguito sarà sufficiente detergere la zona peristomale con acqua e sapone neutro e mantenere asciutta la zona peristomale per evitare macerazione.</p> <p>B. Medicare "a piatto" con medicazione impermeabile per la prima settimana dal posizionamento</p> <p>C. Mobilizzare la sonda con movimenti di rotazione e di intensa trazione, per prevenire eventuali sue incarcerazioni</p> <p>D. Tenere coperta la PEG con garze sterili per le prime 72 ore dopo la sua applicazione, nei giorni a seguire non è necessario disinfettare la cute e controllare eventuali alterazioni della zona peristomale</p>	A
15	<p>Secondo la Legge 8 marzo 2017, n. 24 <i>"Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie"</i>, gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto a:</p> <p>A. Raccomandazioni previste dalle linee guida [...] elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie [...]</p> <p>B. Alle buone pratiche clinico-assistenziali in mancanza delle raccomandazioni previste dalle linee guida [...]</p> <p>C. Le risposte A e B sono entrambe corrette</p> <p>D. Nessuna delle precedenti</p>	C

	Quesito	Riportare risposta corretta
16	<p>Individui gli interventi di educazione sanitaria da prevedere nel piano di dimissione ad un paziente in terapia immunosoppressiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Istruire la persona assistita circa le modalità e i tempi di assunzione del farmaco</li> <li>B. Istruire la persona assistita circa i potenziali rischi legati all'assunzione del farmaco</li> <li>C. Istruire la persona assistita circa le possibili interazioni con altri farmaci e alimenti</li> <li>D. Tutte le risposte sono corrette</li> </ul>	D
17	<p>L'Infermiere è tenuto a rispettare la volontà della persona assistita di NON voler essere informata sul proprio stato di salute (art. 20 del Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche 2019)?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Sì, se l'informazione rifiutata è però necessaria per la salute di soggetti terzi, l'Infermiere si adopera a responsabilizzare l'assistito fornendo le informazioni relative al rischio e alla condotta potenzialmente lesiva</li> <li>B. Sì poiché l'informazione è di competenza medica</li> <li>C. No se ciò costituisce una decisione poco autodeterminata</li> <li>D. Sì sempre</li> </ul>	A
18	<p>Tra i requisiti essenziali per la costruzione delle Linee Guida si riconoscono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. La valutazione rigorosa delle fonti attraverso una revisione sistematica della letteratura</li> <li>B. La multidisciplinarietà del gruppo di lavoro con il coinvolgimento di membri rappresentanti gli assistiti o i caregiver; nonché la programmazione di consultazioni regolari con gli stakeholders</li> <li>C. La chiara esplicitazione dei livelli delle evidenze e della forza delle raccomandazioni</li> <li>D. Tutte le precedenti</li> </ul>	D
19	<p>Nella norma n. 219 del 22 dicembre 2017 "Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento", si specifica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere revocate in qualsiasi momento</li> <li>B. Le disposizioni anticipate di trattamento sono obbligatorie</li> <li>C. Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere registrate esclusivamente in presenza delle forze dell'Ordine</li> <li>D. Le disposizioni anticipate di trattamento perdono di valore se la persona è incosciente</li> </ul>	A

	Quesito	Riportare risposta corretta
20	<p>Che cosa è lo stomacare?</p> <p>A. Si definisce stomacare l'igiene, l'apparecchiatura della stomia e l'educazione dell'assistito alla gestione della stomia</p> <p>B. Si definisce stomacare la valutazione prechirurgica dell'area in cui apparecchiare la stomia</p> <p>C. Si definisce stomacare il lavaggio del moncone stomale</p> <p>D. Si definisce stomacare la protezione gastrica in caso di terapia con farmaci antiinfiammatori</p>	A
21	<p><b>Indicare 6 i fattori di rischio che possono condurre alla caduta accidentale in ambito assistenziale</b></p> <p><u>Non modificabili</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- età avanzata e/o associata a fragilità</li> <li>- cadute pregresse</li> <li>- comorbidità (es. degenerazione maculare, glaucoma, demenza, etc.)</li> </ul> <p><u>Modificabili</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- instabilità motoria, dell'equilibrio o del cammino, riflessi rallentati</li> <li>- incontinenza</li> <li>- malnutrizione e sarcopenia</li> <li>- vertigini, capogiri</li> <li>- disturbi del sonno</li> <li>- ipotensione posturale</li> </ul> <p><i>PUNTI 1 PER OGNI AFFERMAZIONE CORRETTA</i></p>	
22	<p><b>Indicare 4 principali manifestazioni cliniche del paziente con pneumotorace</b></p> <p>Tosse secca</p> <p>Dispnea grave</p> <p>Tachicardia</p> <p>Ttachipnea</p> <p>Cianosi</p> <p>Dolore toracico improvviso e acuto</p> <p>Crepitazione sottocutanea</p> <p>Iperfonesi o timpanismo</p> <p><i>PUNTI 1,5 PER OGNI AFFERMAZIONE CORRETTA</i></p>	
23	<p><b>Il lavaggio delle mani può essere sociale, antisettico e chirurgico. Cosa differenzia i vari tipi di lavaggio</b></p> <p>Tempo, prodotto utilizzato, scopo/esito</p> <p>Lavaggio sociale (40-60 secondi); con acqua e sapone o disinfettanti per le mani a base di alcol</p>	

	<p>Lavaggio antisettico (90 secondi circa); con sapone antisettico è indicato nelle aree ad alto rischio prima di qualsiasi procedura invasiva, dopo il contatto con ferite o materiale biologico infetto, prima di assistere pazienti particolarmente suscettibili alle infezioni, dopo aver assistito pazienti infetti.</p> <p>Lavaggio chirurgico (5 minuti circa) delle mani si esegue con sapone antisettico ed è necessario prima di un intervento chirurgico invasivo.</p> <p><i>PUNTI 2 PER OGNI AFFERMAZIONE CORRETTA</i></p>
24	<p><b>Tradurre o restituire il significato della seguente frase</b></p> <p>At the airport there was an enormous queue. I began to worry that I might miss my flight. I had to run to gate 48 and I arrived completely out of breath</p> <p>All'aeroporto c'era una coda enorme. Ho cominciato a preoccuparmi che potessi perdere il mio volo. Ho dovuto correre al gate 48 e sono arrivato completamente senza fiato</p>
25	<p><b>Cosa si intende per LOGOUT?</b></p> <p>La procedura per concludere una sessione di lavoro o l'accesso ad aree riservate</p>







149

# CORRETTORE PROVA SCRITTA I

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI

PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 10 POSTI

DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CATEGORIA D

	Quesito	Riportare risposta corretta
1	<p>La valvola di Heimilch è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Una valvola ad acqua</li> <li>B. Una valvola unidirezionale</li> <li>C. Una valvola bidirezionale</li> <li>D. Uno strumento utile per la pervietà delle vie aeree</li> </ul>	B
2	<p>Cosa significa disfagia?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Deglutizione difficoltosa</li> <li>B. Articolazione difficile della parola</li> <li>C. Impossibilità assoluta al passaggio del cibo nell'esofago</li> <li>D. Dolore crampiforme retrosternale</li> </ul>	A
3	<p>In presenza di paziente iperteso in terapia orale, quale nutriente va limitato?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Zuccheri</li> <li>B. Glutine</li> <li>C. Sodio</li> <li>D. Lattosio</li> </ul>	C
4	<p>Quali sono gli "ausili" facilitanti la movimentazione delle persone assistite?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Carrozine</li> <li>B. Materassi anti decubito, ciambelle, sollevatore</li> <li>C. Sollevatori, teli ad alto scorrimento, cintura ergonomica</li> <li>D. Lenzuolo, cintura ergonomica, barella</li> </ul>	C
5	<p>Il respiro agonico (gasping) si presenta come:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Respiro irregolare, gradualmente più veloce e profondo, poi lento e superficiale, per arrivare a periodi di apnea fino anche a 60 secondi</li> <li>B. Respiro irregolare, superficiale</li> <li>C. Respiro regolare superficiale molto rapido</li> <li>D. Respiro caratterizzato da una riduzione estrema della frequenza degli atti respiratori fino al loro totale arresto</li> </ul>	D
6	<p>L'arteria polmonare trae origine da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Atrio destro</li> <li>B. Atrio sinistro</li> <li>C. Ventricolo sinistro</li> <li>D. Ventricolo destro</li> </ul>	D
7	<p>Ad un paziente sono prescritti 35 milligrammi di furosemide. Sono disponibili soluzioni da 100 millilitri all'1%. Quanti millilitri si devono somministrare?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. 10 millilitri</li> <li>B. 350 millilitri</li> <li>C. 3,5 millilitri</li> <li>D. 35 millilitri</li> </ul>	C

	Quesito	Riportare risposta corretta
8	<p>L'infermiere, come descritto all'interno del profilo professionale, agisce sia individualmente che in collaborazione con altri operatori sanitari e sociali. Con particolare riferimento alla figura dell'operatore di supporto, l'infermiere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto</li> <li>B. Si avvale dell'opera del personale di supporto limitatamente alle attività che concernono l'area alberghiera</li> <li>C. Si avvale dell'opera del personale di supporto solo in assenza di altro personale infermieristico</li> <li>D. Nessuna delle precedenti</li> </ul>	A
9	<p>In caso di rottura di una fiala di farmaco stupefacente è necessario procedere nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Eliminare la fiala rotta apponendo la registrazione sull'apposito registro</li> <li>B. Registrare il prelievo della fiala segnalando una nota relativa all'evento controfirmata da un secondo operatore presente</li> <li>C. L'infermiere denuncia l'evento alla farmacia</li> <li>D. Registrare la fiala prelevata come fosse stata somministrata</li> </ul>	B
10	<p>La contenzione fisica, quale atto di restrizione intenzionale dei movimenti o del comportamento volontario di una persona mediante mezzi fisici, è una procedura che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Deve essere considerata come atto eccezionale, finalizzato al bene della persona ed effettuato nel rispetto della dignità della persona</li> <li>B. Non necessita di prescrizione medica in quanto è sufficiente il giudizio clinico-assistenziale dell'infermiere per procedere all'attivazione</li> <li>C. Deve essere sempre messa in atto per garantire la protezione degli assistiti in stato di agitazione psico-motoria in quanto non esistono strategie che ne consentano la prevenzione</li> <li>D. Tutte le precedenti</li> </ul>	A
11	<p>La rimozione e sostituzione del catetere venoso periferico va effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Ogni 24 ore</li> <li>B. Su richiesta della persona assistita</li> <li>C. In presenza di medicazione sporca</li> <li>D. In presenza di flogosi locale</li> </ul>	D
12	<p>I criteri che indicano una buona funzionalità della pervietà del CVC (Catetere Venoso Centrale) sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. E' possibile iniettare facilmente</li> <li>B. E' possibile aspirare sangue facilmente</li> <li>C. La persona assistita non segnala alterazioni o sensazioni dolorose durante il lavaggio/infusione</li> <li>D. Tutte le risposte sono corrette</li> </ul>	D

	Quesito	Riportare risposta corretta
13	<p>Quale tra le seguenti indicazioni per la ginnastica vescicale è appropriata in paziente portatore di catetere vescicale?</p> <p>A. La ginnastica vescicale non è raccomandata</p> <p>B. La ginnastica vescicale è raccomandata e va effettuata prima della rimozione del catetere ad intervalli superiori a due ore</p> <p>C. La ginnastica vescicale non è raccomandata se viene effettuata ad intervalli inferiori a due ore</p> <p>D. La ginnastica vescicale va sempre effettuata in quanto riduce il rischio che la persona assistita possa presentare ritenzione urinaria dopo la rimozione del catetere</p>	A
14	<p>Quale tra le seguenti affermazioni, in merito alla gestione della PEG (Gastrostomia Endoscopica Percutanea), si ritiene sia corretta?</p> <p>A. Detergere e disinfettare la cute peristomale quotidianamente per la prima settimana dal posizionamento; in seguito sarà sufficiente detergere la zona peristomale con acqua e sapone neutro e mantenere asciutta la zona peristomale per evitare macerazione.</p> <p>B. Medicare "a piatto" con medicazione impermeabile per la prima settimana dal posizionamento</p> <p>C. Mobilizzare la sonda con movimenti di rotazione e di intensa trazione, per prevenire eventuali sue incarcerazioni</p> <p>D. Tenere coperta la PEG con garze sterili per le prime 72 ore dopo la sua applicazione, nei giorni a seguire non è necessario disinfettare la cute ne controllare eventuali alterazioni della zona peristomale</p>	A
15	<p>Secondo la Legge 8 marzo 2017, n. 24 <i>"Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie"</i>, gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto a:</p> <p>A. raccomandazioni previste dalle linee guida [...] elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie [...]</p> <p>B. alle buone pratiche clinico-assistenziali in mancanza delle raccomandazioni previste dalle linee guida [...]</p> <p>C. Le risposte A e B sono entrambe corrette</p> <p>D. Nessuna delle precedenti</p>	C

	Quesito	Riportare risposta corretta
16	<p>Individui gli interventi di educazione sanitaria da prevedere nel piano di dimissione ad un paziente in terapia immunosoppressiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Istruire la persona assistita circa le modalità e i tempi di assunzione del farmaco</li> <li>B. Istruire la persona assistita circa i potenziali rischi legati all'assunzione del farmaco</li> <li>C. Istruire la persona assistita circa le possibili interazioni con altri farmaci e alimenti</li> <li>D. Tutte le risposte sono corrette</li> </ul>	D
17	<p>L'Infermiere è tenuto a rispettare la volontà della persona assistita di NON voler essere informata sul proprio stato di salute (art. 20 del Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche 2019)?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Sì, se l'informazione rifiutata è però necessaria per la salute di soggetti terzi, l'Infermiere si adopera a responsabilizzare l'assistito fornendo le informazioni relative al rischio e alla condotta potenzialmente lesiva</li> <li>B. Sì poiché l'informazione è di competenza medica</li> <li>C. No se ciò costituisce una decisione poco autodeterminata</li> <li>D. Sì sempre</li> </ul>	A
18	<p>Tra i requisiti essenziali per la costruzione delle Linee Guida si riconoscono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. La valutazione rigorosa delle fonti attraverso una revisione sistematica della letteratura</li> <li>B. La multidisciplinarietà del gruppo di lavoro con il coinvolgimento di membri rappresentanti gli assistiti o i caregiver; nonché la programmazione di consultazioni regolari con gli stakeholders</li> <li>C. La chiara esplicitazione dei livelli delle evidenze e della forza delle raccomandazioni</li> <li>D. Tutte le precedenti</li> </ul>	D
19	<p>Nella norma n. 219 del 22 dicembre 2017 "Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento", si specifica che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere revocate in qualsiasi momento</li> <li>B. Le disposizioni anticipate di trattamento sono obbligatorie</li> <li>C. Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere registrate esclusivamente in presenza delle forze dell'Ordine</li> <li>D. Le disposizioni anticipate di trattamento perdono di valore se la persona è incosciente</li> </ul>	A

20	<p>Che cosa è lo stomacare?</p> <p>A. Si definisce stomacare l'igiene, l'apparecchiatura della stomia e l'educazione dell'assistito alla gestione della stomia</p> <p>B. Si definisce stomacare la valutazione prechirurgica dell'area in cui apparecchiare la stomia</p> <p>C. Si definisce stomacare il lavaggio del moncone stomale</p> <p>D. Si definisce stomacare la protezione gastrica in caso di terapia con farmaci antiinfiammatori</p>	A
21	<p><b>Indicare 6 pratiche assistenziali per la prevenzione delle lesioni da pressione</b></p> <p>Movimentazione</p> <p>Nutrizione</p> <p>Idratazione</p> <p>Utilizzo di ausili</p> <p>Igiene-Mantenere cute asciutta</p> <p>Utilizzo di scale per valutarne il rischio</p> <p>Accurato esame della cute</p> <p>Utilizzo di mezzi di barriera (medicazioni preventive)</p> <p>Evitare frizionamento</p> <p>Evitare macerazione</p> <p><i>PUNTI 1 PER OGNI AFFERMAZIONE CORRETTA</i></p>	
22	<p><b>Indicare 4 principali manifestazioni cliniche del paziente con scompenso cardiaco</b></p> <p>Affanno, dispnea</p> <p>Gonfiore a livello di piedi e gambe, edemi declivi</p> <p>Carenza di energia e spossatezza, astenia</p> <p>Sonno disturbato a causa di problemi di respirazione</p> <p>Gonfiore o dolore addominale, perdita di appetito</p> <p>Tosse con espettorato "schiumoso" o catarro</p> <p>Aumento della minzione notturna</p> <p>Confusione</p> <p>Turgore giugulare</p> <p>Ipertensione</p> <p>Oliguria, ritenzione</p> <p>Pallore - Sudorazione</p> <p>Alterazione ritmo cardiaco, tachicardia, alterazione ECG</p> <p>Nausea</p> <p>Edema polmonare</p> <p><i>PUNTI 1,5 PER OGNI AFFERMAZIONE CORRETTA</i></p>	
23	<p><b>Il lavaggio delle mani può essere sociale, antisettico e chirurgico. Cosa differenzia i vari tipi di lavaggio</b></p> <p>Tempo, prodotto utilizzato, scopo/esito</p> <p>Lavaggio sociale (40-60 secondi); con acqua e sapone o disinfettanti per le mani a base di alcol</p>	

	<p>Lavaggio antisettico (90 secondi circa); con sapone antisettico è indicato nelle aree ad alto rischio prima di qualsiasi procedura invasiva, dopo il contatto con ferite o materiale biologico infetto, prima di assistere pazienti particolarmente suscettibili alle infezioni, dopo aver assistito pazienti infetti.</p> <p>Lavaggio chirurgico (5 minuti circa) delle mani si esegue con sapone antisettico ed è necessario prima di un intervento chirurgico invasivo.</p> <p><i>PUNTI 2 PER OGNI AFFERMAZIONE CORRETTA</i></p>
24	<p><b>Tradurre o restituire il significato della seguente frase</b></p> <p>At the age of 54 Martha Jones gave up her job as a psychotherapist, gave away all her money and her flat and threw away her credit cards: apart a few personal belongings, she doesn't own anything. She has lived without money for the last ten years, and has written a book about her experience called " My life without money"</p> <p>All'età di 54 anni Martha Jones ha smesso col suo lavoro di psicoterapeuta, dato via tutti i suoi soldi e il suo appartamento e gettato via le sue carte di credito: tranne pochi effetti personali non possiede nulla. Ha vissuto senza denaro negli ultimi dieci anni, e ha scritto un libro sulla sua esperienza che ha chiamato " la mia vita senza soldi".</p>
25	<p><b>Cosa significa "Zippare" un documento</b></p> <p>In informatica, con il termine <b>zippare</b> si intende una particolare operazione che consente di comprimere uno o più file o un'intera cartella al fine di ridurre le dimensioni originali e quindi lo spazio necessario alla sua memorizzazione o alla sua trasmissione. Il termine zippare deriva dal verbo inglese <b>to zip</b> che significa, letteralmente, <i>aprire o chiudere con una cerniera</i></p>





**10/03/22**

**PROVA ORALE 1**

Il broncospasmo: quali sono gli interventi infermieristici per il trattamento di un episodio acuto.

**PROVA ORALE 2**

Catetere Venoso Centrale: quali sono le raccomandazioni relative al monitoraggio del sito di inserzione

**PROVA ORALE 3**

Quali sono le principali aree di sorveglianza quotidiana nel paziente chirurgico nell'immediato postoperatorio (prime 4-6 ore dopo l'intervento chirurgico)

**PROVA ORALE 4**

Catetere Venoso Centrale: quali sono i tipi di medicazione che possono essere utilizzati per il punto di inserzione.

**PROVA ORALE 5**

Quali sono gli interventi assistenziali da garantire alla persona assistita durante la fase di acme febbrile e di defervescenza.

**PROVA ORALE 6**

Sonda nasogastrica: come deve essere effettuato il corretto posizionamento della sonda nasogastrica

**PROVA ORALE 7**

Il dolore: quali sono le caratteristiche che devono essere valutate in una persona assistita ricoverato in ambito ospedaliero.

**PROVA ORALE 8**

Nutrizione Enterale somministrata con sonda nasogastrica: come devono essere effettuati il controllo e la gestione del ristagno

---

**11/03/2022**

**PROVA ORALE 9**

Come valutare il rischio di sviluppare Lesioni da Pressione

**PROVA ORALE 10**

Quali complicanze nella persona assistita in terapia con chemioterapici antitumorali.

**PROVA ORALE 11**

Raccomandazioni principali nell'inserzione e gestione del Catetere Vescicale

**PROVA ORALE 12**

Assistenza e principi educativi da rivolgere ad una persona assistita con disfagia

**PROVA ORALE 13**

Cosa è la disfagia; quali sistemi di valutazione della disfagia

**PROVA ORALE 14**

Quali interventi mettere in atto prima di effettuare una trasfusione di emocomponenti ed emoderivati

**PROVA ORALE 15**

La prevenzione delle Infezioni Correlate all'Assistenza

**PROVA ORALE 16**

Cosa è l'embolia polmonare, quali si segni e sintomi con cui si presenta.

-----  
**14/03/222**

**PROVA ORALE 17**

Nutrizione Parenterale Totale: gestione e complicanze

**PROVA ORALE 18**

Ossigenoterapia: come gestire la somministrazione di ossigeno e con quali sistemi

**PROVA ORALE 19**

Quali sono gli interventi per la gestione di una persona in iperglicemia ed in ipoglicemia

**PROVA ORALE 20**

Farmaci adenocortiosteroidi: quali i principali effetti collaterali che potrebbero manifestarsi

**PROVA ORALE 21**

Assistenza e principi educativi da rivolgere ad una persona assistita in terapia anticoagulante

**PROVA ORALE 22**

Assistenza e principi educativi da rivolgere ad una persona assistita diabetica

**PROVA ORALE 23**

Assistenza e principi educativi da rivolgere ad una persona assistita nefropatica

### **PROVA ORALE 24**

Assistenza e principi educativi da rivolgere ad una persona assistita cardiopatica

---

**15/03/2022**

### **PROVA ORALE 25**

Assistenza e principi educativi da rivolgere ad una persona assistita con Bronco Pneumopatia Cronico Ostruttiva (BPCO)

### **PROVA ORALE 26**

Assistenza e principi educativi da rivolgere ad una persona assistita in terapia con farmaci vasoattivi

### **PROVA ORALE 27**

La contenzione fisica in un paziente adulto

### **PROVA ORALE 28**

Campo proprio di attività e responsabilità dell'infermiere

### **PROVA ORALE 29**

Valutazione dello stato cognitivo del paziente

### **PROVA ORALE 30**

Caratteristiche delle attività attribuibili all'operatore socio sanitario e responsabilità dell'infermiere

### **PROVA ORALE 31**

Descriva le azioni opportune per una corretta somministrazione del farmaco

### **PROVA ORALE 32**

Assistenza infermieristica alla persona assistita incontinente

---

**18/03/2022**

### **PROVA ORALE 33**

Esiti sensibili alle cure infermieristiche (Nursing-Sensitive Outcomes – NSO): cadute accidentali

### **PROVA ORALE 34**

Assistenza infermieristica nel caso di inaspettato riscontro di una persona in apparente stato di incoscienza

**PROVA ORALE 35**

Lesioni da pressione: classificazione

**PROVA ORALE 36**

Assistenza e principi educativi da rivolgere ad una persona assistita con ictus

**PROVA ORALE 37**

Descriva gli interventi da attivare in caso di arresto cardiocircolatorio

**PROVA ORALE 38**

Assistenza e principi educativi al paziente oncologico

**PROVA ORALE 39**

La medicazione della ferita chirurgica, raccomandazioni rilevanti

**PROVA ORALE 40**

Aspetti peculiari dell'assistenza infermieristica nella fase preoperatoria

---

21/03/2022

**PROVA ORALE 41**

Gestione dei farmaci e dei dispositivi sanitari

**PROVA ORALE 42**

Il processo di assistenza infermieristica

**PROVA ORALE 43**

Gestione assistenziale della persona assistita con stomia.

**PROVA ORALE 44**

Aspetti peculiari dell'assistenza infermieristica alla persona assistita con trauma cranico

**PROVA ORALE 45**

Tracheo-bronco aspirazione: principali raccomandazioni

**PROVA ORALE 46**

Catetere Venoso Periferico: principali raccomandazioni

### **PROVA ORALE 47**

Quali tipi di isolamento esistono e che peculiarità hanno

### **PROVA ORALE 48**

Assistenza alla persona con crisi convulsiva

---

22/03/2022

### **PROVA ORALE 49**

Individui i principi caratterizzanti per la privacy in sanità con particolare riferimento ai dati particolari

### **PROVA ORALE 50**

Le scale di valutazione del dolore e approcci assistenziali

### **PROVA ORALE 51**

Assistenza e principi educativi da rivolgere a persona assistita con patologia cronica metabolica

### **PROVA ORALE 52**

La sindrome da immobilizzazione: assistenza infermieristica ed educazione sanitaria

### **PROVA ORALE 53**

Assistenza alla persona assistita con CPAP

### **PROVA ORALE 54**

Prelievo venoso, arterioso e capillare: principali raccomandazioni

### **PROVA ORALE 55**

Assistenza e principi educativi da rivolgere a persona assistita con tracheostomia

### **PROVA ORALE 56**

La sepsi nel paziente adulto

---

24/03/2022

**PROVA ORALE 57**

Assistenza al paziente con supporto ventilatorio invasivo e non

**PROVA ORALE 58**

Assistenza infermieristica al paziente nei diversi tipi di shock

**PROVA ORALE 59**

Assicurare il bisogno di eliminazione

**PROVA ORALE 60**

I farmaci stupefacenti: utilizzo e gestione

**PROVA ORALE 61**

Argomentare quanto sotto riportato

*Art 1 È individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.*

---

25/03/2022

**PROVA ORALE 62**

Assicurare il bisogno di alimentazione alla persona assistita

**PROVA ORALE 63**

Il carrello dell'emergenza: composizione e utilizzo

**PROVA ORALE 64**

Gestione della persona assistita disfagica a seguito di evento acuto

**PROVA ORALE 65**

Bilancio idroelettrolitico.

**PROVA ORALE 66**

Documentazione clinica e consenso informato: ruolo dell'infermiere

---

**28/03/2022**

**PROVA ORALE 67**

Problematiche correlate al bisogno di alimentazione nel paziente anziano

**PROVA ORALE 68**

Problematiche correlate al bisogno di alimentazione nel paziente ricoverato in terapia intensiva

**PROVA ORALE 69**

Patologie neurologiche degenerative: quali conosce e ruolo dell'infermiere

**PROVA ORALE 70**

Assistenza e principi educativi da rivolgere a persona assistita operata di resezione intestinale

**PROVA ORALE 71**

Principali categorie di farmaci attivi sull'apparato cardiocircolatorio

---

**30/03/2022**

**PROVA ORALE 72**

Ruolo dell'infermiere nel processo di dimissione protetta

**PROVA ORALE 73**

Prevenzione primaria, secondaria e terziaria

**PROVA ORALE 74**

Assistenza e principi educativi da rivolgere a persona assistita affetta da patologia respiratoria infettiva

**PROVA ORALE 75**

Malattie sessualmente trasmissibili

**PROVA ORALE 76**

La fragilità nel paziente anziano: assistenza e principi educativi

**PROVA ORALE 77**

Disturbi alimentari: ruolo dell'infermiere



### **PROVA ORALE 78**

Assistenza infermieristica nel paziente chirurgico, fase pre e post operatoria

### **PROVA ORALE 79**

Problematiche correlate al bisogno di eliminazione nel paziente anziano ospedalizzato

### **ON LINE**

### **PROVA ORALE 80**

Le variazioni delle condizioni neurologiche: aspetti peculiari

### **PROVA ORALE 81**

Interventi infermieristici in caso di reazione allergica da farmaco

### **PROVA ORALE 82**

Gestione della persona assistita con patologia epatica: principali manifestazioni

### **PROVA ORALE 83**

Assistenza e principi educativi da rivolgere alla persona assistita affetta da depressione