
 <p>Regione Lombardia ASL Bergamo</p>	<p>ASL DELLA PROVINCIA DI BERGAMO COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE</p>	 <p>Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Bergamo</p>
--	--	--

PREPARAZIONE PER RADIOGRAFIA DELL'ADDOME DIRETTO (solo nel sospetto di calcolosi renale)

I Pazienti che devono sottoporsi a **Radiografia dell'Addome diretto per sospetta calcolosi renale** devono fare la seguente preparazione all'esame:

1. Seguire **nei due giorni precedenti l'esame** una dieta priva di scorie. In particolare non devono essere assunti cibi o bevande come: frutta, verdura, legumi, cereali, pane, pasta, riso, biscotti, grissini, fette biscottate, vino, dolci, liquori, acqua gassata.
Sono permessi: latte, yogurt, formaggio, carne, pesce, brodo, omogeneizzati, succhi di frutta, uova, acqua naturale.
2. **Giorno precedente l'esame**: assumere un lassativo (come Xprep, a dose intera, o Pursennid, 12 compresse o altro lassativo di medesima composizione) alle ore 8.00.
N.B.: la dose intera del lassativo è da utilizzare nell'adulto. Nel bambino e nel paziente anziano o defedato la dose del lassativo va ridotta del 50%.
3. Il giorno dell'esame presentarsi a digiuno da almeno 4 ore (possono essere assunti liquidi anche zuccherati).
4. E' consentito il proseguimento di eventuali terapie farmacologiche secondo gli schemi consueti.

Si raccomanda di portare eventuale documentazione precedente (esami radiologici e/o ecografici con i referti) relativa alla richiesta.

In caso di rinuncia si prega di avvisare tempestivamente chiamando il numero telefonico

ПОДГОТОВКА К RADIOGRAFIA DELL'ADDOME DIRETTO (solo nel sospetto di calcolosi renale)

Пациенты, которым назначен Radiografia dell'Addome diretto per sospetta calcolosi renale (Рентген брюшной полости по подозрению наличия камней в печени) должны пройти следующую подготовку к анализу:

- 1. В течение двух дней до анализа:** принимать пищу только без шлаков.
В особенности следует исключить: фрукты, овощи, крупы, хлеб, макаронные изделия, рис, печенье, сухари, вино, сладости, ликеры, газированную воду.
Разрешено принимать: молоко, йогурт, сыр, мясо, рыбу, бульон, фруктовые соки, яйца, питьевую воду.
- 2. За день до проведения анализа:** принять слабительное (как, например, полную дозу Хрер или Pirsennid, 12 таблеток, или любое другое слабительное с таким же составом.
N.B. : подная доза слабительного рекомендуется для взрослого. Детям, пожилым людям и людям с серьезными проблемами со здоровьем рекомендуется принимать половину дозы (6 таблеток)
- 3.** В день проведения анализа прийти натощак в течение по меньшей мере 4 часов (можно принимать жидкости, включая сладкие).
- 4.** Не воспрещается принятие других медикаментов в соответствии с назначенным курсом лечения.

Рекомендуется иметь с собой предыдущие результаты анализов (радиографию и/или эхографию), относящиеся к запросу.

В случае отказа от анализа необходимо своевременно сообщить об это м по телефону