

 <p>Regione Lombardia</p>  <p>ASL Bergamo</p>	<p>ASL DELLA PROVINCIA DI BERGAMO</p> <p>COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE</p>	 <p>Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Bergamo</p>
---	---	--

Preparazione Esofagogastroduodenoscopia (EGDS)

Gentile Signora, Egregio Signore,

il suo stomaco deve essere vuoto quindi non mangi e non beva dalla mezzanotte prima dell'esame (**DIGIUNO**).

Nel caso l'esame venga effettuato nel pomeriggio, può fare, il mattino presto, prima delle ore 8.00, solo una colazione leggera.

Se deve prendere delle medicine, beva solo dei piccoli sorsi d'acqua.

NOTA BENE

In caso di sedazione il/la paziente dovrà essere accompagnato/a da una persona in grado di guidare, comunque da una persona maggiorenne responsabile, in quanto il sedativo somministrato compromette la guida nelle ore successive l'indagine.

A causa dell'effetto sedativo dei farmaci somministrati occorrerà il riposo per 6 ore, durante le quali non bisognerà guidare, andare in bicicletta o svolgere altre attività potenzialmente pericolose.

 <p>Regione Lombardia ASL Bergamo</p>	<p>ASL DELLA PROVINCIA DI BERGAMO</p> <p>COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE</p>	 <p>Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Bergamo</p>
--	---	--

Esofagogastroduodenoscopia (EGDS)

PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN

Estimada Señora / Estimado Señor.

Para este examen su estómago tiene que estar vacío, por lo tanto no tiene que comer ni beber **desde la medianoche antes del examen (AYUNO)**.

- SI el examen es por la tarde, en la mañana temprano, antes de las 8.00 horas, puede hacer sólo un ligero sayuno.
- SI tiene que tomar medicinas, sólo puede beber pequeños sorbos de agua.

ATENCIÓN:

En caso de sedación, después del examen no puede regresar a casa solo, debe ser acompañado por una persona capaz de conducir, o bien por una persona mayor de edad responsable, porque a causa del sedativo usado es peligroso que el paciente conduzca en las horas sucesivas al examen.

A causa del efecto sedativo de los fármacos suministrados, tiene que estar en reposo las 6 horas después del examen: no conducir, ir en bicicleta o hacer actividades potencialmente peligrosas.