



Regione
Lombardia

ASL Bergamo

**ASL DELLA PROVINCIA DI
BERGAMO**

COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE
DELLE
STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE E
PRIVATE ACCREDITATE



Azienda Ospedaliera
Papa Giovanni XXIII
Bergamo

**PREPARAZIONE A TC
CON MEZZO DI CONTRASTO IODATO ENDOVENOSO**

(da compilare a cura del Medico prescrittore, barrando ove necessario. Si prega cortesemente di rispondere a tutte le domande indicate)

Il/La Sig/Sig.ra. ha la necessità di essere sottoposto/a a per la seguente indicazione.

La patiente est enceinte(certaine ou soupçonnée) ou pendant l'allaitement : **Si** **No**
La paziente è in stato di gravidanza (certa o presunta) o in fase di allattamento

Il/elle souffre de :

Presenta in anamnesi:

Si **No**

- Paraprotéinémie de Waldenström (*Paraproteinemia di Waldenström*)
- Insuffisance hépatique grave (*Insufficienza epatica grave*)
- Insuffisance rénale modérée/sévère (*Insufficienza renale moderata/severa*)
- Myélome multiple (*Mieloma multiplo*)
- États de grave souffrance d'infarctus ou d'une insuffisance cardio- vasculaire (*Stati di grave sofferenza del miocardio o di insufficienza cardiocircolatoria*)
- Thyréotoxicose (*Ipertireosi*)
- Diabète traité avec la Metformine (*Diabete in trattamento con Metformina*)
- Le traitement anticoagulant est en cours (*È in corso terapia anticoagulante orale*)

Si	No	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> diathèse allergique <i>Diatesi allergica</i>	IN CASO AFFERMATIVO INVIARE IL PAZIENTE ALLA STRUTTURA CHE ESEGUIRÀ L'INDAGINE
-----------	-----------	--	---

Le patient doit se présenter le jour de l'examen avec les résultats récents (maximum 30 jours avant la date de l'exécution de l'examen) de

Il paziente deve presentarsi il giorno dell'esame con gli esiti recenti (massimo 30 giorni precedenti la data di esecuzione dell'esame) di

- **CREATININE (CREATININEMIA)**
- **GLUCOSE (GLICEMIA)**

Data

Firma del medico

N.B. La TACO de la poitrine et de l'abdomen doit être réalisée au moins après 2 jours de l'exécution d'autres enquêtes avec l'aide des produits de contraste (études aux rayons X du tube digestif, urographie, des interventions, etc. ...) et au moins 2 jours après l'exécution des enquêtes endoscopiques.

La TC del torace e dell'addome va effettuata dopo almeno 2 giorni dall' esecuzione di altre indagini contrastografiche (studi radiografici dell'apparato digerente, urografie, interventistica, ecc...) e dall' esecuzione di indagini endoscopiche.

<p>PREPARATION A L' EXAMEN AVEC LE PRODUIT DE CONTRASTE <i>PREPARAZIONE ALL'ESAME CON MEZZO DI CONTRASTO</i></p>

Hydratation abondante (au moins 1,5 litre d'eau) la veille de l'examen.

Ne pas manger (jeuner) les aliments solides et liquides au moins 4 heures avant l'examen.

suivre le traitement habituel à domicile, comme indiqué par le médecin généraliste, à l'exception de

- Metformine qui doit être suspendu deux jours avant l'examen
- β -bloccanti ed ACE-inibitori qui doivent être suspendus le jour de l'examen (car ils peuvent aggraver l'hypotension et rendre leur traitement inefficace)

NOTE BIEN

- nous rappelons que le/**la patient devrait être accompagné par une personne capable de conduire**, cependant par une personne adulte et responsable, car les médicaments administrés peuvent entraver la conduite dans les heures suivantes l'examen.
- après l'examen, il pourrait être prévu un séjour/repos dans la structure d'au moins 30 minutes.