

PER PAZIENTI CHE DEVONO ESEGUIRE L'ESAME

AL MATTINO

Alla cortese attenzione del Medico Curante del Sig.

Preparazione alla somministrazione di MDC radiologico (mezzo di contrasto iodato non ionico) in pazienti con **sospetta o accertata pregressa reazione allergica a farmaci**

Premessa : nessuna preparazione può azzerare il rischio di reazioni allergiche maggiori.

Se le pregresse reazioni sono state GRAVI (anafilassi ,laringospasmo severo) preferire tecniche diagnostiche alternative o NON usare il MDC

Non costituisce maggiore rischio la anamnesi personale o familiare di atopia

Soggetti a rischio sono pazienti :

- ✓ Neonati ed anziani disidratati
- ✓ **Cardiopatici , diabetici, con grave insuff. renale o epatica, con malattie metaboliche od ematologiche**
- ✓ con precedenti reazioni al MDC (rischio del 15-33 %)
(dalle Raccomandazioni della Società Italiana di Allergologia Clinica)

In caso di pregressa REAZIONE ALLERGICA si consiglia la seguente preparazione :

- ❖ **Prednisone 50 mg/os (Deltacortene forte 2 cp) il giorno precedente l'esame ore 18 , ore 23-24 (prima di coricarsi) e 1 ora prima dell'esame stesso**

Cautela deve essere impiegata nei pazienti diabetici o con anamnesi positiva per ulcera peptica : utile in quest'ultimo caso la gastroprotezione con Inibitori della pompa protonica

- ❖ **Claritin 1 cp nei 2 giorni precedenti l'esame ed 1 cp il giorno stesso dell'esame**
- ❖ **Sospendere Beta-bloccanti ed ACE-inibitori (che possono aggravare le ipotensioni e rendere inefficace il loro trattamento)**
- ❖ **Deve essere raccomandata attenzione nella guida di veicoli.**

PER PAZIENTI CHE DEVONO ESEGUIRE L'ESAME AL POMERIGGIO

Alla cortese attenzione del Medico Curante del Sig.

Preparazione alla somministrazione di MDC radiologico (mezzo di contrasto iodato non ionico) in pazienti con **sospetta o accertata pregressa reazione allergica a farmaci**

Premessa : nessuna preparazione può azzerare il rischio di reazioni allergiche maggiori.

Se le pregresse **reazioni sono state GRAVI** (anafilassi ,laringospasmo severo) **preferire tecniche diagnostiche alternative o NON usare il MDC**

Non costituisce maggiore rischio la anamnesi personale o familiare di atopia

Soggetti a rischio sono pazienti :

- ✓ Neonati ed anziani disidratati
- ✓ Cardiopatici , diabetici, con grave insuff. renale o epatica, con malattie metaboliche od ematologiche
- ✓ con precedenti reazioni al MDC (rischio del 15-33 %)
(dalle Raccomandazioni della Società Italiana di Allergologia Clinica)

In caso di pregressa **REAZIONE ALLERGICA** si consiglia la seguente preparazione :

- ❖ Prednisone 50 mg/os (Deltacortene forte 2 cp) il giorno precedente l'esame ore 23-24 (prima di coricarsi); ore 9 il giorno dell'esame e 1 ora prima dello stesso
Cautela deve essere impiegata nei pazienti diabetici o con anamnesi positiva per ulcera peptica : utile in quest'ultimo caso la gastroprotezione con Inibitori della pompa protonica
- ❖ Claritin 1 cp nei 2 giorni precedenti l'esame ed 1 cp il giorno stesso dell'esame
- ❖ Sospendere Beta-bloccanti ed ACE-inibitori (che possono aggravare le ipotensioni e rendere inefficace il loro trattamento)
- ❖ Deve essere raccomandata attenzione nella guida di veicoli.